

商品名：百穩益注射劑

(Bavencio®)

學名：Avelumab

規格與劑量：200 毫克/瓶



### ● 臨床用途：

Bavencio 適用於：

1. 適用於治療轉移性默克細胞癌(Merkel Cell Carcinoma)之成人病人。
2. 併用 axitinib 適用於晚期腎細胞癌 (Renal Cell Carcinoma, RCC)病人的第一線治療。
3. 適用於接受第一線含鉑化學治療後，疾病未惡化之局部晚期或轉移性泌尿道上皮癌(Urothelial Carcinoma, UC)病人之維持療法。

### ● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：  
有肝臟疾病；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 建議有生殖能力的女性在Avelumab治療期間和給予最後一劑後至少1個月內使用有效的避孕措施。
- 3 建議有生育能力的男性病人在Avelumab治療期間和給予最後一劑後至少1個月內使用有效的避孕措施。
- 4 在 Avelumab 治療期間和給予最後一劑後至少 1 個月內不建議餵母乳。

- 5 使用Avelumab治療期間您可能會出現高血糖。如果您有任何高血糖症狀請立即告訴您的醫療照護提供者。
- 6 Avelumab可能會導致嚴重或危及生命的肺部炎症，從而導致死亡。如果您出現新的或惡化的症狀，包括呼吸困難、呼吸急促或咳嗽，請立即告訴您的醫療照護提供者。
- 7 如果您的手腳出現新的或惡化的麻木或刺痛感或肌肉無力，請立即告訴您的醫療照護提供者。
- 8 如果您發現輸注部位有任何發紅、腫脹、瘙癢或不適，請立即告訴您的醫療照護提供者或就醫。
- 9 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

### ● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ **≥15%**

發聲障礙、倦怠、噁心、腹瀉、便秘、嘔吐、體重減輕、食慾減低、輸注相關反應、發熱、咳嗽、呼吸困難、泌尿道感染、背痛、關節痛、貧血、周邊水腫、丙胺酸轉胺酶(ALT)升高和天門冬胺酸轉胺酶(AST)升高。

✓ **< 15%**

心肌炎、血管炎、皮疹、結腸炎、十二指腸炎、胃炎、胰臟炎、腸道穿孔、高血糖、血小板減少、肝炎、肺炎、急性腎損傷、周邊神經病變、重症肌無力、風濕性肌痛和橫紋肌溶解症。

### 如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- ✓ 水泡、脫皮、皮疹發紅。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- ✓ 胸痛、發燒、寒顫、咳嗽、喉嚨痛、咳嗽、呼吸困難。
- ✓ 飢餓或口渴加劇、口乾或皮膚乾燥、流汗。
- ✓ 心跳過快、過慢或不規則
- ✓ 體重迅速增加、臉部、腳部或小腿腫脹
- ✓ 尿液變深或大便變淺、皮膚或眼睛發黃
- ✓ 帶血或黑色、如瀝青般的大便

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 喉嚨痛、聲音改變。
- ✓ 嘴唇、口腔或喉嚨出現潰瘍或白色斑塊。
- ✓ 疼痛、癢、灼熱感、腫脹，或皮下出現硬塊。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。

倦怠、噁心、腹瀉、便秘、食慾減低、輸注相關反應、嘔吐及體重減輕