商品名：雅詩力凍晶注射劑

（Adcetris ®）

學名：Brentuximab Vedotin

規格與劑量：50 毫克/瓶

臨床用途：

1. 用於成人患者，治療復發或頑固型 CD30+何杰金氏淋巴瘤：
   i. 已接受自體幹細胞移植(ASCT)，或
   ii. 無法使用 ASCT 或多重藥物化療，且先前至少已接受兩種治療。
2. 用於治療經自體幹細胞移植後，高復發或惡化風險的 CD30+何杰金氏淋巴瘤之成人患者。
3. 用於成人患者，治療復發或頑固型全身性退行分化型大細胞淋巴瘤。

注意事項：

1. 開始治療前，如有下列情形請先告知醫師：
   腎臟疾病；肝臟疾病；糖尿病；正在使用 Bleomycin 治療；有長期服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物過敏或食物過敏。
2. 持續治療期間，務必讓所有照顧你的醫療人員如醫師、藥師、護理師、牙醫師等知道您正接受本藥的治療。
3. 有需要接受牙科或其他外科處置時，應事先讓該科醫師知道您正接受本藥的治療。
4. 治療期間容易感染，請勤洗手並遠離人群及患有感冒或其他傳染病的人。
5. 可能較易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。
6. 使用本藥品期間不可懷孕。
7. 無論男性或女性患者使用本藥品期間請採取有效的避孕措施，直到停用本藥後至少 6 個月以上。
8. 使用本藥品期間不可哺乳。
9. 請按時回門診追蹤檢查。

副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

—過敏反應，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

—出現與胰臟炎有關的症狀，嚴重胃痛或嘔吐、嚴重背痛。

—出現感染相關症狀/徵象，如高燒、冷顫、喉嚨痛、咳嗽、咳痰、排尿時感到疼痛、傷口久不癒合。

—出現與神經系統異常相關的症狀，情緒狀態或行為改變、手腳麻木或刺痛、頸部僵硬、嚴重肌肉無力。

—出現與肝功能異常相關的症狀，如：皮膚或眼睛變黃、深色尿、極度疲勞、食慾不振、糞便顏色變淺。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

—出現肺部或呼吸相關問題，如：呼吸短促、呼吸困難、咳嗽加重。
—心跳過快或心跳不正常，排尿困難，肌肉無力或痙攣，嚴重腹瀉，感覺遲鈍，灼熱感，神經痛或無力。
—出現血糖上升的相關症狀，如：易渴、易餓、尿多、昏昏欲睡的感覺
—胸痛/胸悶
—咳血
—嚴重頭暈、昏倒
—腺體腫大
—手臂或腿腫脹
—不正常的出血、瘀傷

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：
—掉髮
—頭痛、骨頭痛、關節痛、背痛、肌肉痛
—食慾欠佳
—胃部不適、嘔吐、腹瀉、便秘
—失眠
—焦慮
—體重減輕
—皮膚乾燥
—夜間盜汗

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您