

商品名：癌克-BCG 免疫治療劑
(SII-ONCO-BCG[®])

學名：Bacillus Calmette-Guerin

規格與劑量：40 毫克/1CC/瓶



臨床用途：

用於治療膀胱原位扁平泌尿上皮癌，亦作為僅限於膀胱黏膜層(Ta期或 T1 期)的原發性或復發性之表淺型非侵犯性乳突狀腫瘤於經尿道膀胱腫瘤刮除手術(TURBT)後之輔助性治療。



注意事項：

1. 盡量 BCG 藥液能停留在膀胱內 2 小時。
2. 患者須在灌注 4 小時前及灌注 2 小時後不得攝取任何液體。
3. 開始灌注後的 15 分鐘內患者應先維持俯臥之姿勢，之後每 15 分鐘更換姿勢在每一側，以使藥物能適當的分布至整個膀胱；最後患者須以坐姿將藥物排空。
4. 灌注後 6 小時內排出的尿液需經適當地消毒。
5. 治療後第一次排尿可能有灼熱感。
6. 首次灌注前，應進行結核菌素檢測，若是陽性，則除非有開放性結核感染的證據時才禁止使用該藥物。
7. 有感染 HIV 風險的患者，建議進行完整的 HIV 檢測。

8.建議灌注後一個禮拜不要性行為，或者使用保險套。

9.若有任何出血或創傷跡象，須延後至少一個禮拜再進行治療。

10.此治療方式對於懷孕女性、哺乳婦女及孩童的安全性尚未評估。

11.正在進行抗結核藥物治療，請告知醫師。



副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- 血尿
- 排尿時灼熱或疼痛
- 發燒（ $>38.8^{\circ}\text{C}$ ）、冷顫、非常疲倦
- 嚴重皮疹
- 無法控制的抖動
- 比平常更頻尿

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- 咳嗽
- 噁心嘔吐
- 輕微皮疹
- 關節疼痛

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您