

商品名：艾麥思注射劑

(Alymsys®)

學名：Bevacizumab

規格與劑量：100 毫克/瓶



● 臨床用途：(節錄自藥品說明書)

1. 轉移性大腸直腸癌。
2. 轉移性乳癌。
3. 惡性神經膠質瘤 (WHO 第 4 級)- 神經膠母細胞瘤。
4. 晚期、轉移性或復發性非鱗狀非小細胞肺癌。
5. 卵巢上皮細胞、輸卵管或原發性腹膜癌。
6. 持續性、復發性或轉移性之子宮頸癌。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有心血管疾病；高血壓；蛋白尿；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 Bevacizumab 可能損害女性的生育力。具有生育能力的婦女，在開始使用 bevacizumab 治療之前應先與其討論生育能力的保存策略。
- 3 有生育能力的女性在 Alymsys®治療期間應採取適當的避孕措施。基於藥物動力學的考量，避孕措施應持續至接受最後一劑 Alymsys®後 6 個月以上。

- 4 血管新生已被證實對胎兒的發展非常重要。血管新生在使用 bevacizumab 後會受到抑制，此可能會導致不良的懷孕結果。
- 5 女性在 Alymsys®治療期間最好不要哺乳，而且在接受最後一劑 Alymsys®後至少 6 個月內不要餵哺母乳。
- 6 發生胃腸穿孔應停止使用。
- 7 在進行選擇性手術前至少 28 天，應暫停使用Alymsys®。在手術後至少 28 天且手術傷口完全癒合後再開始進行Alymsys® 的治療。
- 8 對於有嚴重出血或最近曾發生咳血的病人，不可投予 Alymsys® 來治療。
- 9 因容易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。
- 10 Alymsys®為 bevacizumab (AVASTIN®)之生物相似性藥品。
- 11 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ ≥10%

甲溝炎、血小板減少症、白血球減少症、嗜中性白血球減少症、週邊感覺神經病變、高血壓、噁心、腹瀉、嘔吐、腹痛、發燒、疲勞、食慾不振、低血鎂症、低血鈉症、味覺異常、發音困難、眼疾、呼吸困難、鼻出血、咳嗽、便秘、口腔炎、直腸出血、卵巢衰竭、剝落性皮膚炎、關節疼痛、蛋白尿…等。

✓ <10%

敗血症、膿瘍、蜂窩性組織炎、感染、貧血、淋巴球減少症、腦血管事件、暈厥、充血性心臟衰竭、心室上頻脈、血栓栓塞（動脈）、深層靜脈血栓、出血、肺栓塞、腸道穿孔、腸阻塞、直腸陰道瘻管、手足症候群、蛋白尿、骨盆痛…等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ 過敏反應，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- ✓ 出血相關症狀/徵象，如直腸出血、解黑便、咳血、血尿、咖啡色嘔吐物、無來由的瘀青、不易止住的出血。
- ✓ 視力模糊、頭暈、緊張、耳鳴、心跳緩慢或快速。
- ✓ 小便次數或頻率發生變化、下背或側邊痛、尿液混濁。
- ✓ 便秘、胃痛、噁心、嘔吐。
- ✓ 胸痛、突發或劇烈頭痛、視力、語言或行走問題。
- ✓ 使用此藥後數小時內發燒、發冷、呼吸困難、昏厥、胸痛。
- ✓ 癲癇、精神錯亂、嗜睡。
- ✓ 手、腳踝或腳腫脹。
- ✓ 呼吸或吞嚥困難。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 疲倦。
- ✓ 沒有食慾。腹瀉。腸胃不適。味覺改變。
- ✓ 鼻塞。
- ✓ 眼睛或皮膚乾燥，發紅，腫脹，皮膚脫屑。
- ✓ 針頭放置處疼痛腫脹。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。