

商品名：克廢岳注射液

(Covorin®)

學名：Calcium Folate

規格與劑量：50 毫克/瓶



● 臨床用途：

葉酸拮抗劑(如 methotrexate)過量之解毒劑。

● 注意事項：

- 1 Folate calcium 不得使用於患有惡性貧血及其他巨母紅血球貧血所引起次發性 B12 缺乏的患者，其部份血液功能會衰退，然而研究證實神經功能仍不受影響。
- 2 當folinate calcium被用於緩解methotrexate作用時，在腎功能不全，肋膜滲水及腹膜滲水的情況，因其會影響methotrexate的代謝，所以應謹慎使用。
- 3 開始或持續產生任何嚴重的胃腸道毒性反應時，不建議使用 folinate calcium/ 5-fluorouracil治療，直到症狀完全解除。
- 4 腹瀉病人須嚴密監控直至其腹瀉停止，建議病人立即與醫療人員聯繫。
- 5 Folate calcium 是否對懷孕婦女有致命傷害或影響生殖能力尚不得而知，因此，只有當懷孕婦女明確必要服用葉酸時，才可服用。將分娩的孕婦於懷孕期結束前，不應開始使用 folinate calcium 治療。如果在服藥過程中懷孕，應充分告知此藥對胎兒可能發生的嚴

重危險。

- 6 此藥是否分泌於母乳中尚無法確定，由於許多藥品分泌於母乳中，當餵母乳的母親使用 folinate calcium時，應特別小心。
- 7 Folate calcium因會中和巴比妥鹽類，hydantoin抗痙攣劑以及 pyrimidone的作用，而增加易感性兒童發作的頻率。
- 8 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

過敏、類過敏性反應、蕁麻疹……等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ 過敏反應，搔癢或蕁麻疹、臉部或手部腫脹、口腔或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難。
- ✓ 出血相關症狀/徵象，異常出血、瘀傷、虛弱、血便或黑便。
- ✓ 腹瀉。
- ✓ 頭昏眼花或昏厥。
- ✓ 癲癇發作。
- ✓ 口腔或喉嚨出現潰瘍、疼痛或白斑。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 掉髮。
- ✓ 輕微噁心或嘔吐。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

