

商品名：凱博斯凍晶注射劑

(Kyprolis®)

學名：Carfilzomib

規格與劑量：30 毫克/瓶



● 臨床用途：

與下列藥物併用，治療之前曾用過 1 到 3 種療法之復發型或頑固型多發性骨髓瘤成年病人：

Lenalidomide 和 dexamethasone；或

Dexamethasone；或

靜脈注射劑型 Daratumumab 和 dexamethasone；或

皮下注射劑型 Daratumumab 和 dexamethasone。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有肝、腎臟疾病；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 心臟衰竭和缺血的症狀請告知醫師。
- 3 使用 Kyprolis 期間可能嘔吐及（或）腹瀉。若出現脫水症狀應尋求醫療協助。
- 4 使用 Kyprolis 期間可能出現咳嗽或呼吸短促（呼吸困難）。這是用藥當天內最常出現的症狀。若出現呼吸短促應聯絡醫療人員。
- 5 曾觀察到使用 Kyprolis 的病人出現靜脈血栓事件（包括深部靜脈

栓塞與肺栓塞）。針對使用口服避孕藥或荷爾蒙避孕法之病人會有栓塞風險，在接受 Kyprolis 併用治療期間，考慮改用非荷爾蒙避孕方式。

- 6 可能比平常更容易瘀青、出血，或出血停止的時間可能較久，若長時間、異常或大量出血時，請告訴醫療人員。
- 7 若出現肝炎的症狀，包括疲勞加劇或者皮膚或眼睛發黃，應聯絡醫療人員。
- 8 疲勞、頭暈、昏倒及/或血壓降低。出現這些症狀時，不可駕駛或操作機械。
- 9 頭痛、意識混亂、頭暈或失去平衡、難以說話或走路、身體單側力量下降或無力、痙攣或喪失視力，應聯絡醫療人員。
- 10 建議育齡女性於已知或懷疑懷孕時立即告知其醫療人員。建議女性病人於接受 Kyprolis 治療期間及最後一劑治療後 6 個月內，採取有效的避孕措施。建議有育齡女性性伴侶的男性病人，於 Kyprolis 治療期間及最後一劑治療後 3 個月內，採取有效的避孕方法。
- 11 建議病人在接受Kyprolis期間及最後一劑治療後2週內避免哺乳。
- 12 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書 ENDEAVOR)

✓ ≥10%

貧血、血小板低下、腹瀉、噁心、便秘、嘔吐、無力、發燒、上呼吸道感染、肌肉痙攣、頭痛、周邊神經病變、失眠、呼吸困難、咳嗽、高血壓等。

✓ < 10%

嗜中性球低下併發燒、白血球減少、淋巴球低下、嗜中性白血球低下、心房顫動、胃腸道出血、輸注部位反應、肝功能衰竭、敗血症、可逆性後腦病變症候群、腎衰竭、肺栓塞、深部靜脈栓塞、皮疹等。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ 過敏反應，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- ✓ 感染相關症狀/徵象，發燒、寒顫、咳嗽、流鼻水或鼻塞、喉嚨痛、身體疼痛。
- ✓ 出血相關症狀/徵象，異常出血、瘀傷、疲倦或虛弱。
- ✓ 肝功能異常症狀，如尿液顏色變深、皮膚或眼白變黃、大便顏色變淺、食慾不振、嚴重胃部不適或嘔吐。
- ✓ 呼吸困難、胸痛。
- ✓ 手或腳麻木、刺痛或灼熱痛
- ✓ 針頭所在皮膚下出現疼痛、瘙癢、灼燒感、腫脹或腫塊。
- ✓ 心律不整、頭暈、頭暈、昏厥。
- ✓ 手臂或腿部疼痛、發紅或腫脹。
- ✓ 體重快速增加，手、腳踝或腳腫脹。
- ✓ 癲癇發作、頭痛、意識混亂、視力問題

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 背痛、肌肉痙攣。
- ✓ 腹瀉、便秘。
- ✓ 睡眠困難。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。