商品名:輔美康注射劑

(Firmagon ®)

學名:Degarelix

規格與劑量:80毫克/瓶

120 毫克/瓶





### ● 臨床用途:

成年男性晚期荷爾蒙依賴型前列腺癌。

# ● 注意事項:

- 1 無論是持續服用中的藥物或想要服用其他藥物前(如:維他命、中草藥、成藥)或者是有停用藥物或更改劑量時,請務必先告知您的醫師或藥師。
- 2 若您之前曾發生對藥物或食物過敏之情形,請先告知醫師。
- 3 禁用於懷孕或可能懷孕的婦女。
- 4 若有心臟、肝臟、腎臟或糖尿病相關問題請告知醫師。
- 5 用於腹部皮下注射。與其他皮下注射的藥物一樣,注射區域應該作 週期性更改,應選擇無外在壓力的區域,不適合靠近腰帶和束帶, 也不應靠近肋骨。
- 6 請依醫師指示,按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

## ● 不良反應:(節錄自藥品說明書)

#### ✓ 極常見(≥1/10)

潮熱、注射位置不良反應。

#### ✓ 常見(≥1/100, <1/10)

貧血、體重增加、眩暈、頭痛、失眠、腹瀉、噁心、肝轉氨酶升高、 多汗、皮疹、肌肉骨骼痛、男性女乳症、睪丸萎縮、勃起障礙、寒顫、 發熱、疲勞...等。

#### 如果有以下這些副作用,請立刻回門(急)診治療:

- ✓ 過敏反應,如皮膚紅疹、癢、臉或嘴唇或舌頭腫脹、胸悶、呼吸困難。
- ✓ 快速、劇烈或不規律的心跳、頭暈、虛弱。

### 如果有以下這些較輕微的副作用,也請告知您的醫師:

- ✓ 背痛。
- ✓ 潮熱。
- ✓ 注射部位皮膚下出現疼痛、瘙癢、灼痛、腫脹或腫塊。
- ✓ 體重增加。

### 如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用,

也請告知您的醫師。