商品名：**特喜達凍晶注射劑**

(Demylocan®)

學名：Decitabine

規格與劑量：50 毫克/瓶

● 臨床用途：

(1)

Decitabine 適用於治療不適合進行標準誘導化學療法之新診斷出患有原發性或續發性急性骨髓性白血病病人(AML，依據世界衛生組織(WHO)分類)。須符合 Poor-or intermediaterisk Cytogenetics，且不適合用於 Acute Promyelocytic Leukemia (M3 Classification)。

(2)

Decitabine 適用於治療骨髓化生不良症候群(MDS)病人，包括先前曾接受治療及未曾接受治療、所有 French-American-British 亞型之原發性與續發性 MDS(頑固性貧血、環形鐵粒幼細胞的頑固性貧血、頑固性貧血併有過量芽細胞、頑固性貧血併有過量芽細胞轉變型、以及慢性骨髓單核球性白血病)、以及國際預後評分系統分類為中度危險-1、中度危險-2與高危險的病人。

● 注意事項：

1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有心臟疾病；肝功能不全；腎功能不全；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。

2 發生嚴重感染與出血，請立即通知醫師。

3 對於肺部症狀急性發作或肺部症狀因不明原因惡化，請立即通知醫師。

4 具生育能力的婦女在使用Decitabine治療期間應採取有效的避孕措施以避免懷孕。目前尚不確知使用Decitabine治療後須經多少時間才可安全懷孕。

5 男性在接受 Decitabine 治療期間應採取有效的避孕措施，並應遵照醫囑不要生育子女，在治療完成後亦應持續避孕 3 個月。

6 Decitabine不可在懷孕期間使用，也不可用於具生育能力但未採取有效避孕措施的婦女。

7 Decitabine禁止於授乳期間使用。

8 使用Decitabine治療可能會造成不孕。

9 治療期間可能會發生不良的反應，例如貧血。因此，建議在開車或操作機械時一定要小心。

10 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書_AML 適應症)

✓ (≥10%)
肺炎、尿道感染、嗜中性白血球減少症、血小板減少症、貧血、白血球減少症、頭痛、鼻出血、腹瀉、嘔吐、噁心、發燒…等。
✓ (< 10%)
敗血症、竇炎、全血球減少症、過敏、口腔炎、急性發燒性嗜中性白血球皮膚病…等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

✓ **過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸

悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

- ✓ 胸痛、呼吸困難、皮膚冰冷或蒼白。
- ✓ 口乾、口渴、肌肉痙攣。
- ✓ 發燒、寒顫、咳嗽、喉嚨痛、全身酸痛。
- ✓ 頭暈、頭暈、昏厥。
- ✓ 皮膚出現紅色或紫色小點。
- ✓ 臉、手、腳踝或腳腫脹。
- ✓ 異常出血、瘀血或無力。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 頭痛、關節或肌肉疼痛。
- ✓ 心口灼熱、消化不良、胃痛。
- ✓ 針頭注射處搔癢、發紅、疼痛或腫脹。
- ✓ 噁心、嘔吐、便秘、腹瀉。
- ✓ 輾轉難眠。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您