

商品名：兆科注射劑

(Darzalex®)



學名：Daratumumab

規格與劑量：100 毫克/5 mL/瓶



臨床用途：

適用於下列多發性骨髓瘤成人病人：

- 與 lenalidomide 加 dexamethasone 併用，治療不適合接受自體幹細胞移植的新診斷病人，以及先前曾接受至少一種療法治療的病人。
- 與 bortezomib、melphalan 及 prednisone 併用，治療不適合接受自體幹細胞移植的新診斷病人。
- 與 bortezomib、thalidomide 及 dexamethasone 併用，治療適合接受自體幹細胞移植的新診斷病人。
- 與 bortezomib 加 dexamethasone 併用，治療先前曾接受至少一種療法治療的病人。
- 與 carfilzomib 加 dexamethasone 併用，治療先前曾接受一至三種療法治療的復發型或頑固型多發性骨髓瘤病人。
- 與 pomalidomide 加 dexamethasone 併用，治療先前曾接受至少兩種療法(包括 lenalidomide 與一種蛋白酶體抑制劑)治療的病人。

- 做為單一治療用藥，治療先前曾接受治療(包括一種蛋白酶體抑制劑與一種免疫調節劑)且在最後一種療法之治療下出現疾病惡化現象的復發型或頑固型病人。



注意事項：

1. 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
糖尿病；已懷孕或計畫懷孕、正在哺乳；有長期服用的藥物(包括處方藥、成藥、維他命、保健食品)；曾對任何藥物或食物過敏。
2. 如果出現下列任何輸注反應的徵兆或症狀，應立即就醫診治：搔癢、流鼻水或鼻塞；寒顫、噁心、喉嚨痛、咳嗽、頭痛、呼吸短促或呼吸困難。
3. 治療期間及使用最後一劑之後 6 個月內，可能干擾某些檢驗結果，應告知健康照護人員曾經或正在使用本藥。
4. 準備輸血時，應告知健康照護人員(包括輸血中心/人員)正在使用本藥品治療。
5. 治療期間容易感染，請勤洗手並遠離人群及患有感冒或其他傳染病的人。
6. 因容易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。
7. 使用本藥品期間不可懷孕及哺乳。
8. 治療期間及使用最後一劑之後 3 個月內，使用適當的避孕措施。
9. 應於開始使用本藥治療後的 1 週內開始施行抗病毒預防療法，以防帶狀皰疹再活化，治療結束後亦應持續施行 3 個月。
10. 請按時回門診追蹤檢查。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您



副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- **過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- **感染相關症狀/徵象**，如發燒、冷顫、喉嚨痛、耳或鼻疼痛、咳嗽、痰液增加或變色、排尿時感到疼痛、傷口久不癒合。
- **低血鉀症狀**，如肌肉疼痛、痙攣。感覺非常疲倦或虛弱。心跳異常。
- **血糖上升相關症狀**，如：意識模糊、昏昏欲睡的感覺、易渴、易餓、尿多、皮膚潮紅、呼吸急促、呼吸有水果味。
- 不正常的出血或瘀青、鼻出血
- 感覺非常疲倦或虛弱
- 呼吸急促
- 嚴重頭痛或頭暈、昏倒
- 嚴重胃部不適或嘔吐、腹瀉
- 胸痛不適
- 手、手臂、足或腿出現麻木、刺痛或灼熱痛
- 手臂或腿腫脹

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- 疲倦或虛弱
- 背痛、關節痛、骨骼痛、肌肉痙攣
- 感冒的症狀

— 輕微腹瀉、便秘

— 食慾不振

— 失眠

— 顫抖

— 焦慮

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。