

商品名：益彼欣注射液

(Epicin®)

學名：Epirubicin

規格與劑量：10 毫克/瓶

50 毫克/瓶



● **臨床用途：**(節錄自藥品說明書)

- 乳腺癌、惡性淋巴瘤、軟組織肉瘤、胃癌、肺癌、卵巢瘤。

● **注意事項：**

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有心臟、肝、腎功能疾病；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 曾接受藥物治療或放射性治療而引起持續骨髓抑制或嚴重口腔炎，請先告知醫師。
- 3 病人接受 Epirubicin 治療期間，應避免接種活疫苗。可施打死疫苗（又稱去活化疫苗），不過對此類疫苗的反應可能減弱。
- 4 對Epirubicin或本藥品其他成分、其他Anthracycline類或 Anthracenedione類藥物過敏，請先告知醫師。
- 5 Epirubicin 在給藥後一兩天，可能導致尿色變紅，請不需要擔心。
- 6 曾使用Mitozantrone、Mitomycin C或其他Anthracycline類藥物治療，請先告知醫師。

- 7 育齡婦女於治療期間須避免懷孕，並在治療期間和接受最後一劑後至少6.5個月內採取有效的避孕方法。
- 8 接受Epirubicin治療的男性在治療期間和接受最後一劑後至少3.5個月內應採取有效的避孕方法。
- 9 授乳婦女在接受Epirubicin治療期間和最後一劑後至少7天不要哺乳。
- 10 若是膀胱內給藥有下列情形：已侵入膀胱壁之侵襲性腫瘤、泌尿道感染、膀胱發炎、導尿管問題、血尿，請告知醫師。
- 11 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● **不良反應：**(節錄自藥品說明書)

✓ >5%
骨髓抑制、白血球減少、短暫的心電圖改變、嘔吐、噁心、脫髮…等。
✓ <5%
鬱血性心臟衰竭、出血、全血球減少症、紅斑、發燒、意識混亂、血栓栓塞…等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應**，搔癢或蕁麻疹、臉部或手部腫脹、口腔或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難。
- ✓ 尿量或頻尿減少。
- ✓ 心律不整。
- ✓ 發燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛、身體疼痛。
- ✓ 針頭插入部位出現疼痛、搔癢、灼熱感、發紅、腫脹或皮下腫塊。
- ✓ 體重迅速增加、手、腳踝或腳部腫脹。
- ✓ 呼吸困難、冷汗、皮膚呈青紫色。
- ✓ 異常出血、瘀傷、疲倦或虛弱。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 月經週期改變。
- ✓ 腹瀉、噁心、嘔吐。
- ✓ 掉髮。
- ✓ 嘴唇、口腔或咽喉出現潰瘍或白色斑塊。
- ✓ 臉部、頸部、手臂或上胸部發熱或發紅。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。