商品名：備思復凍晶注射劑

(PADCEV®)

學名：Enfortumab vedotin

規格與劑量：30 毫克/瓶

● 臨床用途：

PADCEV 適用於治療患有局部晚期或轉移性泌尿道上皮癌的成人病人：

- 先前接受過 PD-1（programmed death receptor-1） 或 PD-L1（programmed death-ligand 1）抑制劑和含鉑化學治療；或
- 不適合接受含 cisplatin 化學治療，且先前接受過一線以上治療。

● 注意事項：

1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有肝臟疾病；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。

2 建議具有生殖能力的女性在enfortumab vedotin 治療開始前7天內進行驗孕。

3 建議有生殖能力的女性在enfortumab vedotin治療期間和給予最後一劑後至少6個月內使用有效的避孕措施。

4 建議有生育能力的男性病人在enfortumab vedotin治療期間和給予最後一劑後至少4個月內使用有效的避孕措施。

5 在 enfortumab vedotin 治療期間和給予最後一劑後至少 6 個月內不建議餵母乳。

6 使用PADCEV治療期間您可能會出現高血糖。如果您有任何高血糖症狀請立即告訴您的醫療照護提供者。

7 PADCEV可能會導致嚴重或危及生命的肺部炎症，從而導致死亡。如果您出現新的或惡化的症狀，包括呼吸困難、呼吸急促或咳嗽，請立即告訴您的醫療照護提供者。

8 如果您的手腳出現新的或惡化的麻木或刺痛感或肌肉無力，請立即告訴您的醫療照護提供者。

9 如果您有眼睛乾澀、視力模糊或任何視力變化，請立即告訴您的醫療照護提供者。

10 如果您發現輸注部位有任何發紅、腫脹、瘙癢或不適，請立即告訴您的醫療照護提供者或就醫。

11 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ ≥15%
皮疹、疲勞、周邊神經病變、味覺障礙、腹瀉、噁心、便祕、腹痛、乾眼症、尿路感染、出血、貧血、淋巴細胞減少、嗜中性白血球減少。
✓ < 15%
嘔吐、天門冬氨酸轉氨酶 (AST) 升高、高血糖症、丙氨酸轉氨酶 (ALT) 升高、肺炎 (pneumonitis)和輸注部位外滲

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

✓ **過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

✓ 水泡、脫皮、皮疹發紅。

✓ 視力模糊、眼睛乾澀、眼睛疼痛。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

✓ 胸痛、咳嗽、呼吸困難。
✓ 飢餓或口渴加劇、口乾或皮膚乾燥、流汗。
✓ 肌肉或骨骼疼痛。
✓ 手腳麻木、刺痛。
✓ 異常出血、瘀血或虛弱。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

✓ 味覺改變。
✓ 便秘、腹瀉、噁心。
✓ 體重或食慾下降。
✓ 脫髮或頭髮稀疏。
✓ 針頭所在皮膚下出現疼痛、瘙癢、灼燒感、腫脹或腫塊。
✓ 疲倦。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您