


商品名：健仕注射液

(Gemmis®)

學名：Gemcitabine

規格與劑量：200 毫克/瓶



● 臨床用途：

- 非小細胞肺癌、胰臟癌、膀胱癌。Gemcitabine 與 paclitaxel 併用，可使用於曾經使用過 anthracycline 之局部復發且無法手術切除或轉移性之乳癌患者。用於曾經使用含鉑類藥物(PLATINUM-BASED)治療後復發且間隔至少 6 個月之卵巢癌，作為第二線治療。膽道癌。(完整請見仿單)

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 有血球數低、可能需要血液輸注和增加感染可能性的風險。
如果有以下徵候與症狀 感染、發燒、出血時間延長或不預期的出血、瘀傷和呼吸困難，應立即與其醫療照顧者聯絡。
- 3 有肺臟毒性的風險，包含呼吸衰竭和死亡。如果有呼吸困難、喘息或咳嗽時，應立即與其醫療照顧者聯絡。
- 4 有溶血性尿毒症候群及可能引起腎衰竭的風險。如果有尿液顏色或體積改變，瘀傷或出血增加的情況時，應立即與其醫療照顧者聯絡。

- 5 有肝臟毒性的風險，包含肝臟衰竭和死亡。如果有黃疸的徵候、右上腹部疼痛/壓痛的情況時，應立即與其醫療照顧者聯絡。
- 6 有可逆性後腦病變症候群的風險。如果警覺力或行為改變，包含嗜睡或昏迷(恍惚)、痙攣、嘔吐，精神異常，包含神智不清、自覺力及說話能力降低、以及視覺異常時應立即與其醫療照顧者聯絡。
- 7 若病人在懷孕期間使用Gemcitabine，或用藥期間懷孕，對胎兒可能造成危險。
- 8 尚未得知Gemcitabine及其代謝物是否會被分泌至人乳中。因為許多藥物會被分泌至乳汁中，加上Gemcitabine可能會對授乳嬰兒造成嚴重不良反應，應根據藥物對母親的重要性決定應停止授乳或停止用藥。
- 9 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ ≥20%
有噁心/嘔吐、貧血、ALT 增加、AST 增加、嗜中性白血球減少症、Alkaline Phosphatase增加、蛋白尿、發燒、血尿、皮膚起疹、血小板過低、呼吸困難及水腫...等。
✓ <20%
高膽紅素血症、BUN增加、Creatinine增加、腹瀉、出血、感染、掉髮、口腔炎、嗜睡、感覺異常...等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應**，如皮膚紅疹、癢、臉或嘴唇或舌頭腫脹、胸悶、呼吸困難。
- ✓ 胸痛或胸悶、呼吸困難。
- ✓ 發燒、寒顫、咳嗽、喉嚨痛、身體疼痛。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- ✓ 尿液顏色深或糞便蒼白、噁心、嘔吐、食慾不振、胃痛、皮膚或眼睛發黃。
- ✓ 頭痛、精神錯亂、異常嗜睡、疲倦、虛弱或呆滯、視力模糊。
- ✓ 頭昏眼花或昏厥，手、腳踝、腳或小腿腫脹。
- ✓ 噁心、嘔吐、嚴重搔癢、牙齦或鼻子出血。
- ✓ 皮膚上出現紅色或紫色斑點，排尿次數或頻率減少。
- ✓ 手或腿突然無力。
- ✓ 不正常出血、瘀傷或虛弱。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 腹瀉、便秘、食慾不振。
- ✓ 嗜睡。
- ✓ 掉髮。
- ✓ 手、手臂、腿或腳麻木、刺痛或灼熱感。
- ✓ 針所在皮膚下出現疼痛、搔癢、灼熱感、腫脹或腫塊。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。