商品名:安能得微脂體注射劑

(Onivyde[®])

學名:Irinotecan liposome

規格與劑量:50毫克/瓶

(含43 毫克 irinotecan free base/瓶)



● 臨床用途:

Onivyde[®] (irinotecan 微脂體注射劑)適用於轉移性胰腺癌,合併 5-fluorouracil 和 leucovorin 治療曾接受過 gemcitabine 的患者。

● 注意事項:

- 1 開始本藥的治療前,如有下列情形請先告知醫師: 有腎臟疾病;正在服用的藥物(包括處方藥、成藥、維他命、保健 食品);曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 對於Onivyde[®]或irinotecan HCl曾發生嚴重過敏反應的病人禁止使用Onivyde[®]。
- 3 禁止Onivyde[®]與聖約翰草(St. John's Wort)併用。
- 4 若發生感染徵象,例如發燒、寒顫、頭暈或呼吸短促,應立即聯絡 醫療照護人員。
- 5 發生持續嘔吐或腹瀉、黑便或血便、或頭昏眼花、頭暈或昏倒等脫 水症狀時,聯絡醫療照護人員。
- 6 新發生咳嗽或呼吸困難時儘速聯絡醫療照護人員。

- 7 應告知具有生育能力女性對於胎兒的潛在風險,在治療期間與最後 一劑後七個月內採用有效避孕措施,並在已知或疑似懷孕時通知醫 療人員。
- 8 應告知有具生育能力女性伴侶的男性病人,在Onivyde[®]治療期間與 最後一劑後四個月內使用保險套。
- 9 應告知女性在Onivyde®治療期間與最後一劑後一個月內不要哺乳。
- 10 請依醫師指示,按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應:(節錄自藥品說明書)

✓ ≥10%

腹瀉、嘔吐、噁心、口腔炎、感染與寄生蟲感染、疲倦、發燒、食慾 降低、體重減輕、掉髮、淋巴球減少症、嗜中性白血球減少症...等。

✓ < 10%

敗血症、嗜中性白血球減少合併發燒/嗜中性白血球減少合併敗血症、 胃腸發炎、靜脈導管相關感染、脫水...等。

如果有以下這些副作用,請立刻回門(急)診治療:

- ✓ 過敏反應: 搔癢或蕁麻疹、臉部或手部腫脹、口腔或喉嚨腫脹或刺痛、 胸悶、呼吸困難。
- ✓ 胸痛、呼吸困難、咳嗽。
- ✓ 口乾、口渴、肌肉痙攣、噁心或嘔吐、心律不規則。
- ✓ 發燒、寒顫、喉嚨痛、身體疼痛。
- ✓ 嚴重或持續腹瀉、血便或黑便。

如果有以下這些較輕微的副作用,也請告知您的醫師:

✔ 便秘、胃痛。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- ✓ 食慾下降。
- ✓ 嘴唇、口腔或喉嚨出現潰瘍或白斑。
- √ 疲倦或虚弱。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用,

也請告知您的醫師。