

商品名：贊必佳凍晶注射劑

(Zepzelca®)

學名：Lurbinectedin

規格與劑量：4 毫克/瓶



● 臨床用途：

ZEPZELCA 適用於使用含鉑化學治療期間或之後病程惡化之轉移性小細胞肺癌（SCLC）成人病人的治療。

此適應症係依據腫瘤整體反應率以及反應持續時間加速核准，此適應症仍須執行確認性試驗以證明其臨床效益。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有肝疾病；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏；避免攝取葡萄柚產品。
- 2 若出現發燒、其他感染徵象、不正常的瘀傷、出血、疲勞或臉色蒼白，建議病人立即與醫療人員聯繫。
- 3 若出現肝毒性的徵象與症狀，建議病人立即與醫療人員聯繫。
- 4 若發生注射外滲現象，因外滲後發生組織壞死的時間因人而異，請病人立即與醫療人員聯繫並告知徵象與症狀並了解是否發生疑似組織壞死現象。
- 5 若出現橫紋肌溶解性的徵象與症狀，建議病人立即與醫療人員聯

繫。

- 6 孕婦及具生育能力的女性請注意其對胎兒的潛在風險。建議女性病人告知醫療人員已知或疑似懷孕的狀況。
- 7 建議具生育能力的女性病人開始接受ZEPZELCA治療前執行驗孕測試，確認是否懷孕。
- 8 建議具生育能力的女性病人於接受ZEPZELCA治療期間直至最後一劑給藥後6個月採取有效避孕方式。
- 9 若女性在ZEPZELCA治療期間懷孕，請立即告知醫護人員。
- 10 建議有具生育能力女性伴侶的男性病人於接受ZEPZELCA治療期間直至最後一劑給藥後4個月內採取有效避孕方式。
- 11 建議婦女在接受ZEPZELCA治療期間直至最後一劑給藥後至少2週內不要進行母乳哺育。
- 12 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ ≥20%

白血球減少症、淋巴球減少症、疲勞、貧血、嗜中性白血球低下症、Creatinine上升、ALT上升、葡萄糖上升、血小板減少症、噁心、食慾下降、肌肉骨骼疼痛、Albumin下降、便秘、呼吸困難、鈉下降、AST上升、嘔吐、咳嗽、鎂下降以及腹瀉。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ 過敏反應，搔癢或蕁麻疹、臉部或手部腫脹、口腔或喉嚨腫脹或刺痛、胸悶、呼吸困難。
- ✓ 感染相關症狀/徵象，發燒、寒顫、咳嗽、流鼻水或鼻塞、喉嚨痛、身體疼痛。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- ✓ 出血相關症狀/徵象，異常出血、瘀傷、虛弱、血便或黑便。
- ✓ 肝功能異常症狀，如尿液顏色變深、胃痛、大便蒼白、噁心、嘔吐、食慾不振、皮膚或眼睛發黃。
- ✓ 骨骼或關節疼痛。
- ✓ 胸痛、呼吸困難。
- ✓ 針頭所在皮膚下出現疼痛、瘙癢、灼燒感、腫脹或腫塊。
- ✓ 肌肉疼痛、壓痛或無力。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 便秘、腹瀉。
- ✓ 頭痛。
- ✓ 手、手臂、腿或腳麻木、刺痛或灼熱。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。