

商品名：密多邁杏凍晶注射劑

(Mitonco®)

學名：Mitomycin

規格與劑量：10 毫克/瓶



臨床用途：

胃癌、膀胱癌（灌注使用）、肺癌、肉瘤、白血病等症狀之緩解，及其他。



注意事項：

1. 若有腎臟疾病或曾接受放射治療，請先告知醫師。
2. 有需要接受牙科或其他外科處置時，應事先讓該科醫師知道您正接受本藥的治療。
3. 因容易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。
4. 要打任何疫苗（如流感疫苗）前，請先告知醫師。
5. 要服用其他藥物前（如：aspirin 或含 aspirin 的藥品、大蒜精、人參、銀杏、ibuprofen 或類似藥品、止痛劑、維他命 E），請先詢問您的醫師或藥師。

6. 治療期間無論男女都應採取適當的避孕措施。
7. 若注射部位感到疼痛或發生紅腫，請立即告知護理人員。
8. 治療期間容易感染，要遠離人群及患有感冒或其他傳染病的人。
9. 使用本藥品期間不可哺乳。
10. 治療期間請保持口腔清潔、避免感染。用軟毛牙刷或海綿刷牙。儘可能吃一些軟的食物和避免吃太鹹的東西。
11. 患有水痘之病人，請先告知醫師。



副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- 發燒、寒顫、喉嚨痛
- 常流血或瘀青
- 注射部位有痛、腫、紅等情形
- 呼吸困難，腳或腳踝腫
- 口腔極度疼痛，讓你不想吃或喝任何東西
- 嚴重搔癢、起疹子

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- 沒有食慾
- 胃不適
- 掉髮

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您