

商品名：保疾伏

(Opdivo®)

學名：Nivolumab

規格與劑量：120 毫克/瓶

100 毫克/瓶

20 毫克/瓶



● 臨床用途：

無法切除或轉移性黑色素瘤

- 單一療法或併用 ipilimumab 適用於治療無法切除或轉移性黑色素瘤病人。

黑色素瘤之輔助治療

- 適用於黑色素瘤侵犯至淋巴結或已轉移且曾進行完全切除性手術之病人的輔助治療。

其餘適應症可由 QR code 進入藥品仿單查詢平台查詢



● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 若有任何新出現的咳嗽、胸痛或呼吸急促，或前述症狀惡化，請告知醫師。
- 3 若出現腹瀉或嚴重腹痛，建議病人立即聯絡其醫療照護提供者。
- 4 若出現黃疸、嚴重噁心或嘔吐、右側腹部疼痛、昏昏欲睡或容易瘀青或出血，建議病人立即聯絡其醫療照護提供者。
- 5 若出現腦下垂體炎、腎上腺功能不全、甲狀腺功能低下症、甲狀腺功能亢進症及糖尿病的徵兆或症狀，建議病人立即聯絡其醫療照護提供者。
- 6 若出現腎炎的徵兆或症狀，包括尿量減少、血尿、腳踝腫脹、食慾不振，及任何其他腎功能不全症狀，建議病人立即聯絡其醫療照護提供者。
- 7 若出現皮疹，建議病人立即聯絡其醫療照護提供者。
- 8 若出現腦炎的神經學徵兆或症狀，建議病人立即聯絡其醫療照護提供者。
- 9 有發生輸注相關反應的潛在風險。
- 10 使用 OPDIVO 後進行異體造血幹細胞移植(HSCT)之併發症:有移植後併發症的潛在風險。
- 11 OPDIVO 對胎兒有潛在風險，並在確定或疑似懷孕時告知其醫療照護提供者。建議具生育能力的女性在 OPDIVO 治療期間及至 OPDIVO 最後一劑給藥後至少 5 個月，採取有效的避孕措施。
- 12 婦女在接受 OPDIVO 治療期間不得進行哺乳
- 13 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

● **不良反應：**(節錄自藥品說明書-試驗 CA209227)

✓ ≥20%
疲倦、食慾不振、肌肉骨骼疼痛、腹瀉/結腸炎、呼吸困難、咳嗽、肝炎、噁心和搔癢等。
✓ ≥2%
肺炎(pneumonia)、腹瀉/結腸炎、肺炎(pneumonitis)、肝炎、肺栓塞、腎上腺功能不全與腦下垂體炎等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ 過敏反應，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- ✓ 起疱、脫皮、紅疹。
- ✓ 尿液帶血或混濁，排尿次數或頻率減少，臉部、腳或小腿腫脹。
- ✓ 視力模糊、視力障礙、眼睛疼痛或其他視力變化。
- ✓ 混亂、癲癇、頸僵硬、頭痛、嗜睡。
- ✓ 咳嗽、胸悶或疼痛、呼吸困難。
- ✓ 尿液顏色深或糞便顏色蒼白、噁心、嘔吐、食慾不振、胃痛、皮膚或眼睛泛黃。
- ✓ 腹瀉可能伴隨著血，嚴重胃痛。
- ✓ 輸注時出現發燒、發冷、頭暈或皮疹。
- ✓ 飢餓或口渴加劇、口乾、流汗。
- ✓ 手、手臂、腿或腳麻木、刺痛或灼熱。
- ✓ 手掌或腳底出現皮疹、發紅、疼痛、腫脹或水泡。
- ✓ 嚴重的關節或肌肉疼痛、背痛。

- ✓ 心跳過快或過慢。
- ✓ 虛弱、頭痛、疲倦、體重變化、感到寒冷、情緒或行為變化。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 便秘、腹瀉。
- ✓ 針所在皮膚下出現疼痛、搔癢、灼熱感、腫脹或腫塊。
- ✓ 嘴唇、口腔或喉嚨出現潰瘍或白斑。
- ✓ 鼻塞或流鼻水。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。