

商品名：賀雙妥皮下注射劑

(Phesgo®)


學名：Pertuzumab and

Trastuzumab

規格與劑量：600/600

1200/600

毫克/瓶



● 臨床用途：

Phesgo®與化學治療藥物合併使用於：

- 術前輔助療法適用於 HER2 陽性，局部晚期、發炎性或早期乳癌(腫瘤直徑大於 2 cm 或淋巴結陽性)之病人，作為早期乳癌完整治療處方之一部分。
- 術後輔助治療適用於 HER2 陽性且具有高復發風險之早期乳癌病人。

Phesgo®與 docetaxel 併用於治療轉移後未曾以抗 HER2 或化學療法治療之 HER2 陽性轉移性乳癌病人。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：

正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物、玻尿酸酶(hyaluronidase)或食物過敏。

- 2 下列情況發生時立即連絡醫療照護專業人員：新發生或惡化的呼吸急促、咳嗽、足踝/腿部腫脹、臉部腫脹、心悸、24小時內體重增加超過5磅(約2.3公斤)、頭暈或失去意識。
- 3 懷孕女性和具生育能力的女性，懷孕期間和受孕前7個月內暴露於 Phesgo®可能導致胎兒損傷。女性病人若已知或疑似懷孕時應聯絡健康照護提供者。
- 4 具生育能力的女性，在接受 Phesgo®治療期間及最後一劑治療後7個月內應使用有效避孕措施。
- 5 立即聯絡其健康照護提供者並通報任何過敏症狀與給藥相關反應，包括頭暈、噁心、寒顫、發燒、嘔吐、腹瀉、蕁麻疹、血管性水腫、呼吸問題或胸痛。
- 6 Phesgo®可能會導致無臨床症狀與有臨床症狀之心臟衰竭。在接受 Phesgo®併用含有anthracycline化學療法治療的病人，其發生率與嚴重程度最高。
- 7 Phesgo®曝藥可能導致胚胎-胎兒死亡與先天缺陷，包括羊水過少以及表現為肺臟發育不全、骨骼異常和新生兒死亡的羊水過少症候群。
- 8 Phesgo®給藥可能導致嚴重且致命的肺部毒性。因發生全身性過敏、血管性水腫、間質性肺病或急性呼吸窘迫症候群而停止 Phesgo®治療。
- 9 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ ≥10%
禿髮、皮疹、噁心、腹瀉、便秘、嘔吐、貧血、嗜中性白血球減少症、虛弱、疲倦、發燒、注射部位反應、周邊神經病變、味覺異常、頭痛、肌痛、關節痛、咳嗽、流鼻血、呼吸困難、上呼吸道感染、失眠、熱潮紅、丙胺酸轉胺酶(偏高)、天冬胺酸轉胺酶(偏高)...等。
✓ < 10%
紅斑、腹痛、發熱性嗜中性白血球減少症、嗜中性白血球減少性敗血症、周邊水腫、骨骼疼痛、流鼻水、泌尿道感染、低血鉀症、乾眼、心臟衰竭和肺炎/肺纖維化...等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ 過敏反應，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- ✓ 發燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛、身體疼痛。
- ✓ 手腳麻木、刺痛或燒灼痛。
- ✓ 注射部位皮膚下出現疼痛、發紅、瘙癢、灼燒感、腫脹或腫塊。
- ✓ 手、腳踝或腳腫脹。
- ✓ 呼吸困難、胸痛或胸悶、冷汗。
- ✓ 異常出血、瘀傷、虛弱。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 骨骼、肌肉、關節疼痛。
- ✓ 手指甲或腳趾甲變色。

- ✓ 噁心、腹瀉、胃痛、食慾下降、味覺改變或喪失。
- ✓ 皮膚乾燥、皮疹。
- ✓ 頭髮稀疏或脫落。
- ✓ 輾轉難眠。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。