


商品名：派癌休注射劑

(Pexeda[®])

學名：Pemetrexed

規格與劑量：500 毫克/瓶



● 臨床用途：(節錄自藥品說明書)

1. 併用 cisplatin 是治療局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(顯著鱗狀細胞組織型除外)之第一線化療用藥。
2. 單一藥物是局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(顯著鱗狀細胞組織型除外)病人接受 4 個週期含鉑藥物的第一線化療後疾病並未惡化之維持療法。
3. 單一藥物是治療局部晚期或轉移性非小細胞肺癌(顯著鱗狀細胞組織型除外)之第二線治療用藥。
4. 與 pembrolizumab 及含鉑化學療法併用, 做為轉移性, 不具有 EGFR 或 ALK 腫瘤基因異常之非鱗狀非小細胞肺癌的第一線治療藥物。
5. 與 cisplatin 併用於治療惡性肋膜間質細胞瘤。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前, 如有下列情形請先告知醫師：
有腎臟疾病；正在服用的藥物(包括處方藥、成藥、維他命、保健食品)；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 具有生育能力的女性在接受 Pemetrexed 治療期間及接受最後一

劑治療後6個月, 應採取有效的避孕措施。

- 3 若已知或疑似懷孕時, 需通知開立處方者。
- 4 男性若其女性伴侶具有生育能力, 在接受Pemetrexed 治療期間至接受最後一劑治療後3個月, 應採用有效的避孕措施。
- 5 女性於 Pemetrexed 治療期間及接受最後一劑治療後 1 週內不要哺乳。
- 6 指導病人依指示服用葉酸, 並依預約注射維生素B₁₂, 以降低治療相關毒性的風險。指導病人需服用皮質類固醇, 以降低治療相關毒性的風險。
- 7 出現感染徵兆、發燒、出血或貧血症狀時立即聯絡醫師。
- 8 發生持續的嘔吐、腹瀉或脫水的徵狀, 病人應與其醫師聯絡。
- 9 當尿量減少時應立即聯絡他們的醫療人員。
- 10 當皮膚或黏膜出現大皰性病灶和脫落, 應立即聯絡他們的醫療人員。
- 11 當出現呼吸困難或持續咳嗽時應立即聯絡他們的醫療人員。
- 12 當之前放射線照射的部位出現發炎或水泡時, 應立即聯絡他們的醫療人員。
- 13 請依醫師指示, 按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書 PARAMOUNT)

✓ ≥5%
貧血、嗜中性白血球減少症、疲勞、噁心、嘔吐、粘膜炎/口腔炎、水腫...等。
✓ < 5%
血小板減少症、發熱性嗜中性白血球減少症、心室性心搏過速、昏厥、胃腸阻塞、疼痛、憂鬱症、腎衰竭、肺栓塞...等。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。