

商品名：妥利希瑪注射劑

(Truxima®)

學名：Rituximab

規格與劑量：500 毫克/瓶



● 臨床用途：

非何杰金氏淋巴瘤

- ✓ 用於復發或對化學療法有抗性之低惡度 B-細胞非何杰金氏淋巴瘤。
- ✓ 併用 CVP 化學療法用於未經治療之和緩性(組織型態為濾泡型) B 細胞非何杰金氏淋巴瘤的病人。
- ✓ 併用 CHOP 或其他化學療法用於 CD20 抗原陽性之瀰漫性大型 B 細胞非何杰金氏淋巴瘤。
- ✓ 用於做為濾泡性淋巴瘤病人對誘導療法產生反應之後的維持治療用藥。

類風濕性關節炎

- ✓ 與 methotrexate 併用，適用於治療曾接受一種(含)以上之腫瘤壞死因子(TNF)抑制療法治療但效果不彰，或無法耐受的活動性類風濕性關節炎成人病人。
- ✓ 與 methotrexate 併用，經 X 光檢查已證實可減緩關節結構受損的進展。

慢性淋巴球性白血病

- ✓ 適用於與 fludarabine 及 cyclophosphamide 併用，做為 CD20 陽性

慢性淋巴球性白血病(CLL)病人的第一線用藥。

- ✓ 適用於與化學療法併用，做為復發/頑固性的 CD20 陽性慢性淋巴球性白血病病人的治療用藥。

肉芽腫性血管炎(Granulomatosis with Polyangiitis, GPA) (Wegener's 肉芽腫症)及顯微多發性血管炎 (Microscopic Polyangiitis, MPA)

- ✓ 與葡萄糖皮質素(glucocorticoids)併用，適用於治療成人之肉芽腫性血管炎(GPA，亦稱為韋格納肉芽腫症)及顯微多發性血管炎(MPA)。

尋常性天庖瘡(Pemphigus Vulgaris, PV)

- ✓ 與葡萄糖皮質素(glucocorticoids)併用，適用於治療中度至重度尋常性天庖瘡(PV)的成人病人。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有心血管疾病；肺部疾病；肝臟疾病（包括 B 型肝炎）；腎臟疾病；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 不可對孕婦投予Truxima® 靜脈注射劑，除非可能的效益超過潛在的風險。
- 3 婦女開始使用Truxima® 靜脈注射劑到最後一劑的12個月後的期間內都不應授乳。
- 4 在使用 rituximab 治療期間及之後12個月內，產齡婦女應使用有效的避孕方法。
- 5 投予 rituximab 可能導致嚴重(包括死亡)的輸注反應。當發生第三、四級輸注反應時，應停止使用 Truxima® 並給予治療。
- 6 單獨使用 rituximab 治療非何杰金氏淋巴瘤的病人在產生腫瘤溶解症候群後可能發生急性腎衰竭而需洗腎，在某些案例會導致死亡。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- 7 接受 rituximab 的病人可能發生嚴重(包括死亡)的黏膜皮膚反應。
- 8 接受 rituximab 的病人可能發生 B 型肝炎病毒再活化，在某些案例會導致猛爆性肝炎、肝衰竭及死亡。
- 9 接受 rituximab 的病人可能發生 JC 病毒感染而導致進行性多發性腦白質病及死亡。
- 10 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。
- 11 本品Truxima® 為MabThera® 的生物相似藥品。

● **不良反應：** (節錄自仿單低惡度或濾泡淋巴瘤病人中的藥物不良反應摘要)

✓ ≥10%
細菌感染、病毒感染、嗜中性白血球減少症、白血球減少症、噁心、搔癢、皮疹、發燒、寒顫、無力、頭痛...等。
✓ < 10%
肺炎、呼吸道感染、過敏、末梢水腫、臉部水腫、失眠、暈眩、焦慮、耳鳴、耳痛、心肌梗塞、心律不整、高血壓、低血壓、呼吸困難、嘔吐、腹瀉、厭食、蕁麻疹、禿髮、肌痛、潮紅、味覺異常...等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- ✓ 嚴重胃痛、嘔吐物帶血。
- ✓ 胸痛、心跳不規則、突然昏厥。
- ✓ 意識混亂、身體虛弱、手、腳或嘴唇發麻或刺痛。
- ✓ 尿液顏色深或糞便蒼白、噁心、嘔吐、食慾不振、胃痛、眼睛或皮膚發黃。
- ✓ 排尿次數或頻率減少，排尿時疼痛。

- ✓ 頭暈、頭重腳輕、嗜睡。
- ✓ 發燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛、身體疼痛。
- ✓ 出現視力、協調或言語問題。
- ✓ 體重快速增加，手、腳踝或腳腫脹。
- ✓ 異常出血、瘀傷或虛弱。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 腹瀉。
- ✓ 頭痛。
- ✓ 關節疼痛、肌痛。
- ✓ 針頭注射處搔癢、灼燒感、疼痛、腫脹、腫塊。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。