商品名：拓達維注射劑

(Trodelvy®)

學名：Sacituzumab

govitecan

規格與劑量：180 毫克/瓶



● 臨床用途：

Trodelvy 適用於治療先前已接受兩次以上全身性治療無效(其中一次需為治療晚期疾病)之無法切除的局部晚期或轉移性的三陰性乳癌成年病人。

● 注意事項：

1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有肝功能不全病史；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。

2 有嗜中性白血球減少症的風險。在出現發燒、發冷或其他感染徵兆時，立即聯絡其醫療照護人員。

3 如果在治療期間首次出現腹瀉；黑便或血便；脫水症狀(如頭昏、暈眩或昏厥)；由於噁心或嘔吐而無法口服液體；或無法在24小時內控制腹瀉，請立即聯絡其醫療照護人員。

4 如果在輸注期間或之後24小時內出現臉部、唇部、舌頭或喉嚨腫脹、蕁麻疹、呼吸困難、頭昏、暈眩、發冷、寒顫、喘鳴、瘙癢、潮紅、皮疹、低血壓或發燒，請立即聯絡其醫療照護人員。

5 出現無法控制的噁心或嘔吐時，立即聯絡其醫療照護人員。

6 女性病人若懷孕或受孕應告知其醫療照護人員。使用Trodelvy對胎兒的風險與流產的可能性。

7 具生育能力的女性在接受本品治療期間以及最後一次給藥後6個月內，採取有效的避孕措施。

8 其女性伴侶具生育能力的男性病人，在接受本品治療期間及最後一次給藥後3個月內採取有效的避孕措施。

9 哺乳期婦女在本品治療期間及最後一次給藥後1個月內不要哺乳。

10 具生育能力的女性，Trodelvy可能會損害生育能力。

11 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ **最常見的不良反應(≥25%)**
噁心、嗜中性白血球減少症、腹瀉、疲勞、掉髮、貧血、嘔吐、便秘、皮疹、食慾減退和腹痛…等。
✓ **嚴重不良反應**
嗜中性白血球減少症(7%)、腹瀉(4%)和肺炎(3%)…等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

✓ **過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。

✓ 發燒、發冷、咳嗽、喉嚨痛、身體疼痛。

✓ 嚴重腹瀉、噁心、嘔吐。

✓ 異常出血、瘀傷、虛弱。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 便秘、胃痛、食慾不振。
- ✓ 掉髮。
- ✓ 針頭注射處搔癢、發紅、疼痛、腫塊。
- ✓ 皮疹。
- ✓ 疲倦。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您