

商品名：抑佳妥注射劑

(IMJUDO®)

學名：tremelimumab

規格與劑量：300 毫克/瓶



● 臨床用途：

IMJUDO 適用於治療未曾接受全身性療法之晚期或無法切除之肝細胞癌成人病人：

第一週期的合併療法，第一天給予 4 mg/kg 之 IMJUDO，隨後給予 20 mg/kg 的 durvalumab 之後每 4 週使用 durvalumab 20mg/kg 做為單一治療劑

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有腎臟疾病、內分泌疾病、免疫疾病或神經系統疾病；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 建議有生殖能力的女性在IMJUDO治療期間和給予最後一劑後至少3個月內使用有效的避孕措施。
- 3 建議有生育能力的男性病人在IMJUDO治療期間和給予最後一劑後至少4個月內使用有效的避孕措施。
- 4 在IMJUDO治療期間和給予最後一劑後至少3個月內不建議餵母乳。

- 5 使用IMJUDO治療期間您可能會出現高血糖。如果您有任何高血糖症狀請立即告訴您的醫療照護提供者。
- 6 IMJUDO可能會導致嚴重或危及生命的肺部炎症，從而導致死亡。如果您出現新的或惡化的症狀，包括呼吸困難、呼吸急促或咳嗽，請立即告訴您的醫療照護提供者。
- 7 如果您的手腳出現新的或惡化的麻木或刺痛感或肌肉無力，請立即告訴您的醫療照護提供者。
- 8 如果您有眼睛乾澀、視力模糊或任何視力變化，請立即告訴您的醫療照護提供者。
- 9 如果您發現輸注部位有任何發紅、腫脹、瘙癢或不適，請立即告訴您的醫療照護提供者或就醫。
- 10 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ ≥15%
皮疹、腹瀉、食慾下降、噁心、疲勞、瘙癢、肌肉骨骼疼痛和腹痛
✓ < 15%
出血、腹瀉、敗血症、肺炎、皮疹、嘔吐、急性腎損傷、天門冬氨酸轉氨酶 (AST) 升高、丙氨酸轉氨酶 (ALT) 升高、甲狀腺功能低下和貧血

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- ✓ 水泡、脫皮、皮疹發紅。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- ✓ 視力模糊、視力改變、眼睛疼痛。
- ✓ 胸痛、發燒、寒顫、咳嗽、喉嚨痛、咳嗽、呼吸困難。
- ✓ 飢餓或口渴加劇、口乾或皮膚乾燥、流汗。
- ✓ 困惑、癲癇、脖子僵硬、手腳麻木、刺痛。
- ✓ 心跳過快、胸悶或胸痛、呼吸困難
- ✓ 異常出血、瘀血或虛弱。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 味覺改變。
- ✓ 便秘、腹瀉、噁心。
- ✓ 體重或食慾下降。
- ✓ 針頭所在皮膚下出現疼痛、瘙癢、灼燒感、腫脹或腫塊。
- ✓ 疲倦。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。