

商品名：明諾凱凍晶乾燥注射劑

(MINJUVI®)

學名：Tafasitamab

規格與劑量：200 毫克/瓶



● 臨床用途：

MINJUVI®與 lenalidomide 併用及接續單獨使用，適用於治療復發型 (relapsed)或難治型(refractory)且不適合接受自體幹細胞移植(ASCT)的瀰漫性大型 B 細胞淋巴瘤(DLBCL)成人病人。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
曾對任何藥物或食物過敏；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）。
- 2 Tafasitamab因併用lenalidomide，懷孕期間或排除懷孕可能性前，不可對女性施予治療。
- 3 建議有生殖能力的女性病人在MINJUVI給予最後一劑後至少3個月內使用有效的避孕措施。
- 4 建議有生殖能力的男性在MINJUVI治療期間使用有效的避孕措施。
- 5 在 MINJUVI 治療期間以及接受最後一劑藥物後至少 3 個月內不建議餵母乳。
- 6 不建議在MINJUVI治療期間接種活性疫苗。

- 7 使用MINJUVI治療期間您可能會出現過敏反應。如果您有出現蕁麻疹、反覆咳嗽、哮喘和喉嚨發緊／聲音變化症狀請立即告訴您的醫療照護提供者。
- 8 如果您發現輸注部位有任何發紅、腫脹、瘙癢或不適，請立即告訴您的醫療照護提供者或就醫。
- 9 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ **≥15%**

皮疹、感染、嗜中性白血球減少症、乏力、貧血、腹瀉、便秘、噁心、腹痛、血小板減少症、頭痛、感覺異常、味覺異常、背痛、肌肉痙攣、咳嗽、周邊水腫、發熱、食慾降低、肺炎以及嗜中性白血球減少症

✓ **< 15%**

敗血症、骨髓抑制、低血鈣症、低血鎂症、高膽紅素血症、轉胺酶數值上升(包含ALT及/或AST上升)、脫髮、紅斑、關節痛、肢體疼痛、肌肉骨骼疼痛、體重減輕

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應**，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- ✓ 水泡、脫皮、皮疹發紅。
- ✓ 視力模糊、眼睛乾澀、眼睛疼痛。
- ✓ 胸痛、咳嗽、呼吸困難。
- ✓ 飢餓或口渴加劇、口乾或皮膚乾燥、流汗。
- ✓ 異常出血、瘀血或虛弱。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 味覺改變。
- ✓ 便秘、腹瀉、噁心。
- ✓ 體重或食慾下降。
- ✓ 脫髮或頭髮稀疏。
- ✓ 針頭所在皮膚下出現疼痛、瘙癢、灼燒感、腫脹或腫塊。
- ✓ 疲倦。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。