

商品名：優赫得凍晶注射劑

(Enhertu®)

學名：Trastuzumab

deruxtecan

規格與劑量：100 毫克/瓶



● 臨床用途：

單獨使用適用於治療轉移後曾接受過兩種以上抗 HER2 療程、具有無法切除或轉移性 HER2 陽性乳癌的成人病人。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有肝功能不全病史；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 Enhertu® 使用經驗中曾通報間質性肺病(ILD)及肺炎(pneumonitis) 案例，若有相關症狀請聯絡醫師。
- 3 若左心室射出分率(LVEF)降低或發生症狀性鬱血性心臟衰竭請聯絡醫師。
- 4 具有生育能力的女性，於Enhertu® 治療期間以及最後一劑藥物施用後至少7個月內，應使用有效的避孕措施。
- 5 男性病人如果有具生育能力的女性伴侶，在 Enhertu® 治療期間及最後一劑藥物施用後至少 4 個月內，應使用有效的避孕措施。

- 6 不建議施用Enhertu® 於懷孕女性。發現懷孕的女性必須立即聯絡醫師。若女性於Enhertu® 治療期間或最後一劑Enhertu® 後7個月內懷孕，建議進行密切監測。
- 7 女性應於初次施用Enhertu® 前停止哺乳。女性可於結束治療7個月後開始哺乳。
- 8 男性病人在治療期間以及接受最後一次Enhertu® 後至少4個月內不得冷凍或捐獻精子。
- 9 由於有發生如疲倦、頭痛與眩暈等不良反應的潛在可能，在駕駛或操作機器時格外小心。
- 10 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ 常見不良反應 (≥20%)

噁心、疲倦、嘔吐、掉髮、便秘、食慾減退、貧血、嗜中性白血球減少症、腹瀉、血小板減少症、咳嗽、白血球減少症與頭痛...等。

✓ 第≥3 級的不良反應(< 20%)

嗜中性白血球減少症、貧血、噁心、疲倦、白血球減少症、淋巴球減少症、嘔吐、血小板減少症、低血鉀症、間質性肺病、腹瀉、發熱性嗜中性白血球減少症、呼吸困難、腹痛、食慾減退與丙胺酸轉胺酶 (ALT)升高...等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ 過敏反應，如皮疹、蕁麻疹，皮膚紅腫癢、起水泡、脫皮。喘鳴。胸悶。呼吸困難、吞嚥或說話困難。不尋常的聲音沙啞。臉、口腔、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- ✓ 胸痛、呼吸困難、冒冷汗。
- ✓ 口乾、口渴、肌肉痙攣、噁心或嘔吐、不規則心跳。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

- ✓ 發燒、發冷、咳嗽、流鼻涕或鼻塞、喉嚨痛、身體疼痛。
- ✓ 體重迅速增加，手、腳踝或腳水腫。
- ✓ 肌肉或骨骼疼痛。
- ✓ 異常出血、瘀傷、疲倦或虛弱。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 便秘、腹瀉、食慾不振。
- ✓ 掉髮。
- ✓ 針頭注射處搔癢、發紅、疼痛、硬塊或腫脹。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。