商品名：癌吉清注射劑（Ogivri®）

學名：Trastuzumab

規格與劑量：440 毫克/瓶

臨床用途：

Ogivri 應使用於下列 HER2 過度表現或 HER2 基因 amplification 之早期乳癌、轉移性乳癌患者。

Ogivri 合併 capecitabine (或 5-fluorouracil) 及 cisplatin 適用於未曾接受過化學治療之 HER2 過度表現轉移性胃腺癌 (或胃食道接合處腺癌) 的治療。

注意事項：

1. 要服用其他藥物前，請先詢問您的醫師或藥師。
2. 若您有心臟、肺部疾病，或曾經做過胸部放射療法，請告知醫師。
3. Trastuzumab 可能會導致無臨床症狀及有臨床症狀之心衰竭，請定期追蹤，有相關症狀請聯絡醫師。
4. Trastuzumab 可能會導致嚴重且具致命性的肺毒性。肺毒性包括呼吸困難、間質性肺炎、肺浸潤、胸膜滲液、非心因性肺水腫、肺功能不全、肺缺氧、急性呼吸窘迫症候群、以及肺纖維化，有相關症狀請聯絡醫師。
5. 使用本藥品期間若有懷孕及哺乳或相關需求，請告知醫師。
6. 治療期間容易感染，要遠離人群及患有感冒或其他傳染病的人。
7. 有需要接受牙科或其他外科處置時，應事先讓該科醫師知道您正接受本藥的治療。

副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

—心跳過快或不規律

—感覺呼吸短促、呼吸困難

—發燒、寒顫

—咳嗽增加

—噁心、嘔吐

—嚴重腹瀉

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

—頭痛

—輕微腹瀉

—皮膚疹

—喉嚨痛

—胃痛、背痛或其他部位痛

—失眠

—虛弱

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，
也請告知您的醫師。