

商品名：威絡益凍晶注射劑

(Vyloy®)

學名：Zolbetuximab

規格與劑量：100 毫克/瓶



● 臨床用途：(節錄自藥品說明書)

- 與含氟嘧啶 (fluoropyrimidine)和含鉑的化學治療併用，適用於 Claudin (CLDN) 18.2 陽性、第二型人類表皮生長因子受體 (HER2)陰性的局部晚期不可切除或轉移性胃腺癌或胃食道接合處 (GEJ)腺癌成人病人的第一線治療。

● 注意事項：

- 1 開始本藥的治療前，如有下列情形請先告知醫師：
有肝、腎功能疾病；正在服用的藥物（包括處方藥、成藥、維他命、保健食品）；曾對任何藥物或食物過敏。
- 2 輸注 zolbetuximab 期間和輸注後（至少2小時，若有臨床需要可延長時間），應注意是否出現過敏反應，包括高度暗示為全身性過敏反應的症狀和徵象（蕁麻疹、反覆咳嗽、哮喘和喉嚨發緊／聲音變化）。
- 3 應監測是否出現輸注相關反應的徵象和症狀，包括噁心、嘔吐、腹痛、唾液分泌過多、發熱、胸部不適、寒顫、背痛、咳嗽和高血壓，這些徵象和症狀通常會在中斷輸注後可以恢復。
- 4 沒有關於孕婦使用zolbetuximab的數據。只有在益處大於潛在風險

時，方可給孕婦使用zolbetuximab。

- 5 不建議在 zolbetuximab 治療期間餵母乳。
- 6 建議生育能力的女性在治療期間使用有效的避孕措施以避免懷孕。
- 7 請依醫師指示，按時回門診追蹤、檢驗、檢查。

● 不良反應：(節錄自藥品說明書)

✓ ≥10%
低蛋白血症、食慾減退、嘔吐、噁心、周邊水腫…等。
✓ <10%
藥物過敏、全身性過敏反應、唾液分泌過多、輸注相關反應…等。

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- ✓ **過敏反應**，如皮疹；蕁麻疹；搔癢；皮膚發紅、腫脹、起水皰或脫皮（伴隨或不伴隨發燒）；喘息；胸部或喉嚨緊繃；呼吸、吞嚥或說話困難；聲音沙啞；或口腔、臉部、嘴唇、舌頭或喉嚨腫脹。
- ✓ 電解質失衡的跡象包括：情緒變化；意識混亂；肌肉疼痛、痙攣或抽搐；虛弱；顫抖；平衡感改變；心跳異常；癲癇發作；食慾不振；或嚴重的胃部不適或嘔吐。
- ✓ 感染跡象包括發燒、發冷、咽喉劇痛、耳痛或鼻竇痛、咳嗽、痰量增加或痰液顏色改變、排尿疼痛、口腔潰瘍或傷口久治不癒。
- ✓ 出血跡象，如嘔血或咳血；嘔吐物呈咖啡渣樣；尿血；黑便、血便或柏油樣便；牙齦出血；陰道異常出血；無故或逐漸增大的瘀傷；或無法止血。
- ✓ 血糖過高或過低的跡象包括：呼吸有水果味、頭暈、呼吸急促、心跳加快、意識混亂、嗜睡、虛弱、臉色潮紅、頭痛、異常口渴或飢餓、頻尿、發抖或出汗。
- ✓ 肺部血栓的跡象包括胸痛或胸悶、咳血、呼吸急促、心跳加速或呼吸

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

困難。

- ✓ 出現不正常的灼熱感、麻木感或刺痛感。
- ✓ 發燒。
- ✓ 皮膚蒼白。
- ✓ 手或腿腫脹。
- ✓ 輸液過程中或輸液後發生嚴重的過敏及輸注相關反應。

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- ✓ 疲倦或虛弱。
- ✓ 腹瀉或便秘。
- ✓ 食慾下降。
- ✓ 胃痛。
- ✓ 體重減輕。
- ✓ 胃部不適和嘔吐(嚴重或持續不消退，請立即告知醫師)。

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，

也請告知您的醫師。