

國泰綜合醫院復健科語言治療組 編印

● *About* 關於說話性語音障礙


言語聲音障礙是一個總稱，指的是在知覺、動作產生、語段或音韻歷程(語音組合)出現困難而影響言語清晰度(俗稱臭乳呆)。依據種類可被分成器質性的或功能性的。器質性語音障礙是因神經、構造、生理結構、知覺等原因引起。功能性語音障礙是特發性的，並沒有特定的原因。說話性語音障礙會影響言語的形式或是語言中語音的功能，尤其是對於語音的感知及操弄語音的能力，而這些能力是發展音韻能力的十分重要的要素。

原因

1. **構造器官的問題**：唇、舌、腭、咽、牙齒等構音器官的缺陷，或動作協調不佳。
2. **聽覺障礙**：孩子當聽力受損時，常會造成在接收日常生活中的語音產生困難，因此當發覺孩子有聽力問題時，即時的就診也十分重要。
3. **功能性的原因**：孩子擁有正常的聽力，但大腦對於語音的接收和區辨能力弱，或是不知道如何學習語音的音韻規則，造成難

以自我覺察語音的正確與否，而使用其他語音作替代。

4. 環境因素：環境中有他人表達不清楚，造成出現錯誤學習的情況；若家長對於過度保護，減少使用和學習說話的機會，也會影響語音和語言發展。



● *Signs /Symptom & Development* 類型和發展

發展

兒童的語音發展是階段性的成熟，隨着年齡的增長，掌握更多的語音，讓表達的語音清晰度(=讓他人聽得懂)逐漸提升，以下將介紹中文語音的發展里程碑。

年齡	語音發展里程碑	語音清晰度
2歲	所有母音和四個聲調	50%
3歲	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ ㄍ ㄎ ㄏ	75%
4歲	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ ㄍ ㄎ ㄏ	90%
5歲	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ ㄍ ㄎ ㄏ	90% 以上
6歲	ㄅ ㄆ ㄇ ㄉ ㄊ ㄋ ㄌ ㄍ ㄎ ㄏ	

類型

發音的過程中語音表達困難或錯誤，使得語音表達不清楚難以讓聽者了解，主要有以下的常見錯誤類型：

1. 省略音：應該發的聲音被省略掉，如：「蛋糕」說成「安凹」。
2. 扭曲音：語音歪曲大幅度改變但大致可仍有某程度的相似，如：「大人」說成「歪冷」。
3. 不送氣音化：以ㄅㄆㄇㄏㄏㄨㄨㄨ各代替ㄆㄑㄒㄓ，如：「泡麵」說成「抱麵」。
4. 塞音化：以ㄅㄆㄇㄏ代替正確的語音，如：「走路」說成「斗路」。
5. 塞擦音化：以ㄅㄆㄇㄏㄏㄨㄨ代替正確的語音，如：「弟弟」說成「ㄅㄆㄇㄏㄏㄨㄨ」。
6. 擦音化：以ㄆㄑㄒ代替正確的語音，如：「出門」說成「書門」。
7. 舌根音化：以ㄅㄆㄇ代替正確的語音，如：「肚子」說成「褲子」。
8. 聲隨韻母省略：以ㄩ代替ㄅㄆㄇㄏㄏㄨㄨ，如：「單子」說成「搭

子」。

9. 母音化：以母音替代所有的子音。

- **Treatment 治療**

孩子的語音發展一路到了4歲才逐漸成熟穩定，4歲前當孩子表達不清晰時，多是發展性的語音問題；但如果到了4歲仍然有語音表達不清晰，可先找尋居家附近的復健科或耳鼻喉科醫師尋求協助，再由醫師轉介給語言治療師進行評估和治療。接受治療的年齡以4-6歲上小學前為佳，可避免孩子因語音不清楚而影響未來學科學習(如:注音學習)，或是影響孩子的社交互動表現。

若有任何疑問，請洽國泰綜合醫院
總院 (02) 2708-2121 分機 3746
汐止 (02) 2648-2121 分機 3650
我們將竭誠為您服務！