

雅銘雷射手術注意事項

■ 簡介

雅銘雷射是一種利用高能量的光束，對眼睛的特定部位進行切割，是一種在眼科常用的雷射治療方式，主要用來處理續發性白內障的問題。雅銘雷射可以在門診進行，不需要開刀，只要在患眼點上麻醉藥水，過程只需要幾分鐘，並且沒有傷口，所以恢復很快，也不會有太多的副作用或併發症。

■ 檢查/治療目的

病人經醫師檢查評估適應症如下：續發性白內障、玻璃體前房沾黏、復發性角膜糜爛。

■ 治療方式

雷射水晶體後囊切開術、雷射玻璃體離析術、角膜前基質穿刺術。

■ 治療效益

(一)水晶體後囊切開術：白內障手術後將保留部分水晶體囊袋已放置人工水晶體，但有少數人會發生後囊混濁，導致續發性白內障，而使術後視力再次惡化。可使使用雷射後囊切開術以期改善視力。

(二)玻璃體離析術：白內障手術後於少數狀況可能產生玻璃體前房沾黏，可使用雷射玻璃體離析術將沾黏去除，減少後續玻璃體視網膜拉扯之併發症。

(三)角膜前基質穿刺術：使用較低能量之雷射直接對焦於鬆脫角膜表皮細胞下的基底膜，鬆脫表皮細胞就會漸漸貼於底下包曼氏層。復發性角膜糜爛經此方法治療，大多不會有大範圍糜爛復發，但有時仍會有殘存些許不舒服再現，但較術前少且輕微。

■ 治療合併症

(一)前房發炎：使用抗發炎藥物。

(二)眼壓升高：使用降眼壓藥物。

(三)其他罕見併發症，例如角膜水腫：依病人狀況，調整藥物。

