商品名：柔癌捕注射劑

（Zaltrap ®）

學名：Aflibercept

規格與劑量：100 毫克/4 CC/瓶

臨床用途：

大腸直腸癌。

注意事項：

1. 開始治療前，如有下列情形請先告知醫師：

   懷孕；哺乳；心臟病；高血壓；中風；凝血異常；腎臟病；消化性疾病；曾對藥物或食物或其他物質過敏！
2. 有需要接受牙科或其他外科處置時，應事先讓該科醫師知道您正接受本藥的治療。
3. 因容易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。
4. 要服用其他藥物前，包括成藥、維他命、中草藥等，請先詢問您的醫師或藥師。
5. 使用本藥品期間不可懷孕。治療期間及完成治療至少 3 個月以內，無論男女都應採取有效的避孕措施。
6. 治療期間容易感染，要遠離人群及患有感冒或其他傳染病的人。
7. 請按時回門診追蹤檢查。

副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

—過敏反應，如皮膚紅疹、癢，臉或嘴唇或舌頭腫脹

—解血便或黑便

—胸痛、呼吸困難、咳血

—尿液混濁或泡沫多、水腫

—傷口久不癒合

—嚴重腹瀉、胃痛、嘔吐

—極度口渴

—發燒、冷顫、咳嗽、喉嚨痛、全身酸痛

—暈眩或頭昏眼花

—上、下肢或一側身體感覺虛弱、麻麻的

—抽搐、意識混淆、視力模糊

—突發性或劇烈的頭痛

—小腿疼痛，或視力、言語、行走出現問題

—非預期性的出血、瘀青、虛弱

國泰綜合醫院藥劑科 關心您

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

—食慾欠佳

—輕微疲累或虛弱

—輕微腹瀉

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您