商品名：癌得星注射劑

（Endoxan®）

學名：Cyclophosphamide

規格與劑量：500 毫克/瓶

臨床用途：

淋巴性白血病、散發性腫瘤、慢性淋巴性白血病、骨髓性淋巴病、淋巴肉芽腫及各種網狀組織細胞增多症，防止腫瘤復發及其他。

注意事項：

1. 要服用其他藥物前（如：aspirin 或含 aspirin 的藥品、大蒜精、人參、銀杏、ibuprofen 或類似藥品、止痛劑、維他命 E），請先詢問您的醫師或藥師。
2. 注射任何疫苗前要先和醫生討論（例如感冒疫苗）。
3. 若是您有服用 allopurinol、phenobarbital、succinylcholine、tamoxifen、類固醇（如 cortisone, prednisone），或其他的抗癌藥物或放射線治療，請先告知醫師。
4. 若您有心臟、腎臟、肝疾病，或血液、骨髓的疾病，請告知醫師。
5. 用藥後請多喝水並經常解尿。
6. 有需要接受牙科或其他外科處置時，應事先讓該科醫師知道您正接受本藥的治療。
7. 常洗手；治療期間容易感染，要遠離人群以及患有感冒或其他傳染病的人。
8. 使用本藥品期間不可懷孕及哺乳，直到停藥後至少 6 個月內。
9. 避免粗重的運動或其他可能造成受傷、割傷、瘀青的情況。輕柔地刷你的牙齒，小心使用尖銳物、包括刮鬍刀、指甲刀。

副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

—過敏反應：臉部或手部發癢、發疹、水腫；嘴部或喉嚨腫、刺痛感，胸口悶悶的，呼吸困難
—水腫、脫皮、皮膚紅
—血尿或血便，排尿時有疼痛感
—發燒、寒顫、喉嚨痛、咳嗽
—嚴重噁心、嘔吐、沒有食慾
—非預期性出血、瘀青、虛弱
—皮膚或眼睛變黃

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

—月經周期改變
—掉髮，皮膚或指甲的顏色改變
—食慾不振
—靜脈注射部位感到疼痛、水腫、發癢、或刺激感
—口腔或喉嚨痛、有白色斑點

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您