

**商品名：達卡巴仁注射劑  
(Dacarbazine®)**

**學名：Dacarbazine**

**規格與劑量：200 毫克/瓶**



**臨床用途：**

惡性黑色素腫瘤症狀之改善。



**注意事項：**

1. 要服用其他藥物前（如：aspirin 或含 aspirin 的藥品、大蒜精、人參、銀杏、ibuprofen 或類似藥品、止痛劑、維他命 E），請先詢問您的醫師或藥師。
2. 接種任何疫苗前（如：流感疫苗），請先告知醫師。
3. 若有肺、肝、腎疾病，請先告知醫師。
4. 因容易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。
5. 此藥會使您的皮膚對陽光敏感，出門時應採取適當的防曬措施，如擦防曬乳液、穿長袖衣服、戴太陽眼鏡。
6. 使用本藥品期間不可懷孕及哺乳。
7. 治療期間無論男女都應採取適當的避孕措施。

8. 治療期間易感染，請遠離人群以及患有感冒或其他傳染病的人。



**副作用：**

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- 發燒、冷顫、喉嚨痛
- 非預期的出血、瘀青
- 嚴重腹瀉、口腔疼痛
- 喘鳴、呼吸困難
- 嚴重皮膚癢疹
- 嚴重噁心、嘔吐

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- 食慾欠佳
- 頭痛
- 倦怠
- 掉髮

**如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。**

國泰綜合醫院藥劑科 關心您