

商品名：賀樂維注射液（Halaven®）

學名：Eribulin

規格與劑量：1 毫克/2 CC/瓶



臨床用途：

乳癌。



注意事項：

1. 開始治療前，如有下列情形請務必告知主治醫師：
曾發生藥物或食物過敏，並描述當時發生的過敏症狀；心電圖出現 QT 波延長；腎臟病；肝臟疾病；電解質不平衡（低血鉀或低血鎂）；有正在持續服用的藥品、保健品、維他命等。
2. 需要接受牙科或其他外科處置時，應事先讓該科醫師知道您正接受本藥的治療。
3. 常洗手。治療期間容易感染，要遠離人群以及患有感冒或其他傳染病的人。
4. 因容易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。
5. 治療期間採取適當的避孕措施。
6. 用藥期間避免哺餵母乳。
7. 按時回診檢查。



副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- 過敏反應，如：臉或手出現癢、蕁麻疹或腫，喉嚨或口腔出現腫或刺痛、胸悶、呼吸困難
- 出現感染相關症狀，如：發燒、寒顫、咳嗽、喉嚨痛及全身酸痛、解尿時有疼痛感、傷口不癒合
- 心跳過快/或感到異常
- 頭昏眼花或昏厥
- 呼吸短促
- 手、足踝或腳腫脹
- 不正常的出血或瘀青
- 異常的疲倦或虛弱
- 手、手臂、足或腿出現麻木、刺痛或灼熱痛

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- 疲勞或虛弱
- 頭痛
- 掉髮
- 輕微噁心、嘔吐、腹瀉、便秘
- 背部或骨頭疼痛
- 唇、口腔、喉嚨潰瘍或白點
- 體重減輕、食慾不振

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您