

商品名：艾達黴素注射劑（Zavedos®）

學名：Idarubicin

規格與劑量：5 毫克/瓶



臨床用途：

成人的急性非淋巴性白血病（ANLL）、成人與孩童的急性淋巴性白血病（ALL）及其他。



注意事項：

1. 開始治療前，如有下列情形請先告知醫師：

曾發生藥物過敏；有服用任何藥物，特別是 aspirin 或含 aspirin 的藥品、大蒜精、人參、銀杏、ibuprofen 或類似藥品、止痛劑、維他命 E；膽囊疾病；心臟病；肝臟疾病；腎臟病；放射線治療。

2. 有需要接受牙科或其他外科處置時，應事先讓該科醫師知道您正接受本藥的治療。

3. 因容易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。

4. 接種任何疫苗前（如：流感疫苗），請先告知醫師。

5. 常洗手。治療期間容易感染，要遠離人群及患有感冒或其他傳染病的人。

6. 治療期間無論男女都應採取適當的避孕措施。

7. 避免哺餵母乳。



副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- 發燒、發冷、或喉嚨痛
- 不正常的出血或瘀青
- 嚴重的胃痛或血便
- 呼吸困難、腿及腳水腫
- 蕁麻疹、紅疹或嚴重的搔癢
- 在注射部位發生痛、紅、腫

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- 食慾不佳
- 腹瀉、胃痛
- 掉頭髮
- 頭痛

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您