商品名：排多癌注射劑

（Mitomycin-C ®）

學名：Mitomycin

規格與劑量：10 毫克/瓶

臨床用途：

胃癌、膀胱癌（灌注使用）、肺癌、肉瘤、白血病等症狀之緩解，及其他。

注意事項：

1. 若有腎臟疾病或曾接受放射治療，請先告知醫師。
2. 有需要接受牙科或其他外科處置時，應事先讓該科醫師知道您正接受本藥的治療。
3. 因容易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。
4. 要打任何疫苗（如流感疫苗）前，請先告知醫師。
5. 要服用其他藥物前（如：aspirin 或含 aspirin 的藥品、大蒜精、人參、銀杏、ibuprofen 或類似藥品、止痛劑、維他命 E），請先詢問您的醫師或藥師。
6. 治療期間無論男女都應採取適當的避孕措施。
7. 若注射部位感到疼痛或發生紅腫，請立即告知護理人員。
8. 治療期間容易感染，要遠離人群及患有感冒或其他傳染病的人。
9. 使用本藥品期間不可哺乳。
10. 治療期間請保持口腔清潔、避免感染。用軟毛牙刷或海綿刷牙。儘可能吃一些軟的食物和避免吃太鹹的東西。

副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

—發燒、寒顫、喉嚨痛

—常流血或瘀青

—注射部位有痛、腫、紅等情形

—呼吸困難，腳或腳踝腫

—口腔極度疼痛，讓你不想吃或喝任何東西

—嚴重搔癢、起疹子

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

—沒有食慾

—胃不適

—掉髮

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您