

商品名：百博拓普康注射劑

(Topotecan BioPro Inj®)

學名：Topotecan

規格與劑量：4 毫克/瓶



臨床用途：

卵巢癌、小細胞肺癌及其他。



注意事項：

1. 要服用其他藥物前（如：aspirin 或含 aspirin 的藥品、大蒜精、人參、銀杏、ibuprofen 或類似藥品、止痛劑、維他命 E），請先詢問您的醫師或藥師。
2. 接種任何疫苗前（如：流感疫苗），請先告知醫師。
3. 有需要接受牙科或其他外科處置時，應事先讓該科醫師知道您正接受本藥的治療。
4. 因容易出血，日常活動須儘可能避免受傷，如刷牙時請選用軟毛牙刷、刮鬍子時以電動刮鬍刀取代一般剃刀。
5. 治療期間，避免開車、或從事須精神專注之工作、或操作危險器械。
6. 治療期間容易感染，要遠離人群及患有感冒或其他傳染病的人。

7. 使用本藥品期間不可懷孕及哺乳。停藥後至少 6 個月才能懷孕。

8. 治療期間，請定期回門診追蹤檢查。



副作用：

如果有以下這些副作用，請立刻回門（急）診治療：

- 過敏反應：臉或手出現癢、蕁麻疹或腫；口腔或喉嚨腫或刺痛、胸悶、呼吸困難
- 心跳加快或心跳不規律
- 發燒、寒顫、咳嗽或喉嚨疼痛
- 嚴重噁心、嘔吐或腹瀉
- 唇部或口腔，感到疼痛或發生潰瘍
- 不正常的疲勞或虛弱

如果有以下這些較輕微的副作用，也請告知您的醫師：

- 便秘
- 食慾減退
- 輕微皮疹
- 胃痛

如果還有其他您覺得是這個藥物所造成的副作用，也請告知您的醫師。

國泰綜合醫院藥劑科 關心您