

認識正顎手術

國泰綜合醫院口腔顎面外科編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 何謂正顎手術

將不正常比例的上下顎骨，經由手術改變上下顎比例，使其達到平衡。

■ 正顎手術的分類

- 勒福一型上顎截骨術
- 片段式勒福一型截骨術
- 上顎前牙根尖下截骨術
- 下顎前牙根尖下截骨術
- 顏成型術
- 下顎直枝截骨術
- 下顎直枝矢狀劈開術
- 削骨手術

■ 病 因

- 上、下顎骨不對稱的發育成長造成。

■ 症 狀

- 暴牙
- 戽斗
- 顏面歪斜
- 方臉
- 咀嚼不易
- 發音不準
- 咬合不良

■ 治 療

將不協調的上顎或下顎，依不同的手術方式，將上頷或下頷擺在協調的位置。

■ 正顎手術前注意事項

- 依病況若有需要請遵照醫師指示理髮、刮鬍子及鬢角以利手術進行。
- 若手術後上下牙齒鎖住，請買油壺兩個，以便術後進食用。
- 手術前一天晚上刷牙及刷舌頭。
- 手術前一天洗頭及洗澡。

- 填寫手術及麻醉同意書。
- 手術前一天晚上十二時起至手術時，不可進食及喝水。
- 手術前，每小時使用漱口水含漱，以減少口內細菌，並預防感染的發生。

■ 正顎手術後注意事項

- 返回病房後、請稍搖高床頭，以保持呼吸順暢。
- 手術後仍須禁食至醫師指示時間，然後依開水→流質→半流質→軟質食物循序漸進的進食。
- 手術後若有呼吸困難、痰液無法自行咳出、大量血水流出或倒流入喉嚨情形，請告知護理人員。
- 手術後三個月內進食軟質食物。
- 手術後手術區域半年內避免外力撞擊。
- 按時服藥，均衡飲食，以促進骨頭癒合。
- 手術後，須冰敷患部外側，反覆 20—30 分鐘，共 24—48 小時，其後則須改用反覆熱敷至腫脹消退為止。

■ 定期門診追蹤

- 縫線於一、二週後回牙科門診拆線，術後 6—8 週間，每 1—2 週均須回診檢查。但如有特殊情況，則馬上回診。
- 手術後三個月、六個月、一年、二年須回門診照 X 光，以確定骨癒合穩定。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 3662-3663

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 2890-2895

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 3720

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AK200.075.2014.01 三修