

葡萄糖-六-磷酸鹽脫氫酶缺乏症

(G-6-P-D 缺乏症，俗稱蠶豆症)

國泰綜合醫院 嬰兒室 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 何謂蠶豆症

此種疾病屬於常見的顯性性聯遺傳疾病，其發生率男生多於女生，患者紅血球的細胞膜容易受到特定物質破壞而產生溶血現象，特別是接觸某些外來的誘發物質時更易發生。

■ 臨床症狀

- 易引起新生兒嚴重黃疸。
- 部份患者服用某些藥物一至三天後，會產生急性溶血現象，而有倦怠、微燒、眼鞏膜泛黃、腹部或背部痛和深色尿液等症狀。

■ 日常生活照顧注意事項

- 因蠶豆症的人服用某些藥物或食品，容易發生溶血性貧血，故就診時須主動告之醫師嬰兒有蠶豆症，並持備忘卡。

- 衣櫥及廁所不可放置樟腦丸及茶丸（臭丸）。
- 不可使用龍膽紫(紫藥水)及吃蠶豆。
- 如發現突然有黃疸或臉色蒼白或茶色尿時，應立刻就醫。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 嬰兒室轉 3555-6

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 嬰兒室轉 2621-2

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 嬰兒室轉 2757-8

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AD1R1.208.2013.12 七修