

# 子宮搔刮術

國泰綜合醫院產房 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院  
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

## ■ 前言

子宮搔刮術通常是針對不正常的子宮出血或某些因素使胎兒無法保存時，所進行的手術，可作為檢查或治療之用。

## ■ 手術前注意事項

- 手術當天包括開水需禁食 6-8 小時(慢性病治療藥物仍可服用或帶至醫院備用)。
- 手術期間必須有家屬陪同。

## ■ 手術過程

- 協助注射點滴，等入手術室後注射麻醉藥品—讓您睡著後再進行手術，由主治醫師執行子宮搔刮手術。
- 手術後麻醉藥效未退，故需至恢復室休息 1~2 小時，待麻醉藥效消退時才返家休息。

## ■ 手術後注意事項

- 手術後 24 小時內，請勿自行開車、騎車，如需

外出，務必請家人陪同，勿做重大事件之決定，如：帳戶現金移轉等。

- 回家後先喝水，如無不適可採少量多餐進食，有嘔吐噁心情形，則休息半小時後再試，採漸進式恢復正常飲食。但術後一星期內請減少食用含有人蔘、酒精、辛辣等刺激性食物。
- 手術後宜休息半天至一天，並請按時服藥。
- 手術後一週內不宜做粗重工作，採淋浴方式洗澡。
- 術後請勿服用中藥材。
- 二週內不宜有性行為。
- 手術後一星期內會有少量出血，若出血量比平常月經量多或腹痛、發燒時應立刻就醫。
- 手術後陰道塞入紗布：無、有；塞入紗布數\_\_\_\_\_片、取出時間\_\_\_\_\_。
- 手術後請按預約時間回門診檢查。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 產房轉 3551-2

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 產房轉 3800-2

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 產房轉 2751-2

我們將竭誠為您服務！ 國泰綜合醫院關心您！

AE1V1.213.2016.09 十修