

減胎手術

國泰綜合醫院產房 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 前言

在超音波引導下減少多胞胎妊娠數目，從而改善現存胎兒的存活機會。

■ 手術前注意事項

- 夫妻雙方皆須同意，並簽妥手術同意書。
- 手術前應排空膀胱。
- 手術期間必須有家屬陪同。

■ 手術過程

- 檢查時採平躺姿勢，請將身心儘量放輕鬆，減輕因子宮壓迫腹部血管所造成的不適。
- 進行腹部超音波，以確定妊娠週數及胎兒情形。
- 消毒腹部皮膚，並在超音波引導下以無菌技術操作減胎手術。

- 減胎後以超音波確認胎兒的情況，若無異狀即可返家臥床休息。
- 穿刺部位如針孔大小，以無菌透明膠帶覆蓋，請採淋浴方式洗澡。

■ 手術後注意事項

- 可能產生的合併症，如流產、早產、早期破水、陰道出血、子宮感染或收縮等，發生率不超過 1/100。
- 減胎術後不須限制飲食，手術後多休息、避免從事粗重或劇烈活動。
- 手術後 5-7 天應再返回門診檢查。
- 若有下列症狀請立刻返院檢查：
 - ◆ 不尋常的胎兒過度活動或無胎動。
 - ◆ 子宮收縮或劇烈腹痛，陰道有異常分泌物（如大量透明分泌物或出血）
 - ◆ 發燒或全身顫抖。
 - ◆ 出現嚴重噁心、嘔吐及心律不整等情形。

■手術後 5-7 天請返回婦產科門診檢查。

已為您預約：

___月___日___午 ___門診追蹤檢查。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 產房轉 3551-2

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 產房轉 2601-2

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 產房轉 2751-2

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AE1V1.233.2013.12 五修