

心臟電氣生理檢查及不整脈經 導管燒灼術注意事項

國泰綜合醫院 心臟內科 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 檢查前

- 填寫檢查同意書
- 皮膚準備：兩側鼠蹊剃毛
- 禁食
- 更換手術衣
- 注射靜脈點滴：雙手皆放置靜脈點滴針頭
- 護理人員測量下肢血循並予註記足背動脈處及強度劃記

■ 檢查中

- 在血管穿刺位置局部麻醉，因此整個過程您是清醒的。
- 常見之穿刺部位有兩側鼠蹊處動靜脈與頸靜脈。
- 電極導管順著血管，在 X 光透視下到心臟定位後，再將電極連接於顯示器上，即可顯示出心臟內電氣訊號，加以記錄作判讀。

- 檢查治療過程約需 3~4 小時，過程中會使用電刺激及藥物，使心跳加快以誘發心律不整來加以檢查，通常心律不整不會持續太久，但若有不舒服，如胸痛、頭暈、喘不過氣來...等，請隨時告知醫護人員。

■ 檢查後

- 導管若由鼠蹊處放入者，會於鼠蹊處放一個砂袋或綁上加壓止血帶，以加壓止血。
- 術後需臥床平躺 8 小時，當日儘量勿下床，加壓中的鼠蹊部不可彎曲，不可坐起。
- 平躺 8 小時中，要在床上使用尿壺或便盆解小便，不可下床以免傷口流血，若解不出可告知護理人員協助處理，切不可用力，必要時需放置導尿管。
- 檢查完後，若沒有任何不舒服，就可以開始進食，但要注意不要嗆到。
- 護理人員會定時測量血壓、脈搏及觀察傷口情形。
- 第二天醫護人員會幫您的傷口換藥，請注意 3 天內不可弄濕傷口。
- 當您發覺有任何不適，請馬上通知醫護人員。

■ 出院護理指導

- 出院後，若感胸痛、呼吸不適、心悸、頭暈時須隨時返院檢查。
- 一般電燒檢查 1 週及 1 個月後返診追蹤三個月。
- 如果電燒灼術過程順利無合併症發生，出院後 2 週內，建議不宜跑步，預防出血合併症。

祝 健 康 快 樂 ！

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5711-5713

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 2751-2752

新竹國泰綜合醫院 (03)5278999 轉 8111-8113

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

AA200.265.2014.03 七修