

血管硬化劑注射治療 後照顧須知

國泰綜合醫院手術室 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 前言

血管瘤和血管畸形，都可以利用硬化劑進行病灶注射來治療，注射後有些得以局部壓迫性包紮治療，依情況可再加上雷射或手術，使治療結果更達完美。

■ 治療前注意事項

- 請您或您的親人填寫手術同意書。
- 醫師會評估您的狀況，決定麻醉方式。須麻醉者，應空腹 6-8 小時(包括水及牛奶)；如為局部麻醉者，則不需禁食。
- 嬰兒採全身麻醉，故治療前 6 小時不得飲食，以防麻醉當中嘔吐，而發生意外。
- 全身靜脈麻醉者，檢查時須家屬陪同。

■ 治療中注意事項

- 全身靜脈麻醉者，醫護人員會先協助您準備好治療姿勢，才讓您睡著進行治療。
- 局部麻醉者，注射治療過程您必須放輕鬆並聽從醫護人員的指示。

■ 治療後注意事項

- 採全身靜脈麻醉者，注射治療後，需至恢復室休息 1~2 小時，待意識完全清醒，無身體不適才可返家休息，返家後可先喝水，如無不適方可採少量多餐方式進食，但如有嘔吐、噁心情形，宜半小時後再試，並採漸進式恢復正常飲食。
- 若無噁心、嘔吐情形或其他限制，請儘量多攝取水份，幫助藥物代謝排出。
- 治療後 24 小時內可能會有疼痛情形，可使用冰敷或止痛藥。
- 治療部位會局部腫脹，約壹星期左右才會消退。
- 治療後 24 小時內為了安全起見，請勿自行開車、騎機車或外出，如外出務必請家人陪同，且勿做重大事件之決定，如簽支票等。

■治療後之照顧因人而異，通常會使用面罩或束衣進行局部壓迫。穿戴時間：

a.治療後請全天穿戴持續二星期，以利壓迫(洗澡或用餐時可暫時脫掉)。

b.穿戴二星期後只需於晚間睡覺時穿戴，白天則不必穿戴。

c.面罩或束衣需持續使用二個月。

■若發生皮膚局部變化或產生傷口時，請馬上電話聯絡或回院就診。

■返院復診時間 _____ 年_____月_____日

上午或下午 第 _____ 診 醫師_____

諮詢電話：(02) 27082121 轉 3370 手術室

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

國泰綜合醫院關心您！

AC000.283.2014.03 四修