

術後傷口引流管路照護 注意事項

國泰綜合醫院 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 引流管留置的目的：

一般於手術時，醫師會依情況放置引流管，作為收集滯留於體腔內的體液引流出體外，如血液、淋巴液、膿液、腹水、膽汁及腸液等，以達到下列目的：

- 減少對傷口或局部組織的壓迫。
- 預防感染。
- 降低引流液對周圍器官的刺激，以促進傷口癒合或達到治療效果。

■ 注意事項：

- 預防移位或牽扯：
 - ◆ 可以安全別針夾在病人衣服上或以固定帶懸掛於床欄，並預留適當長度，方便病人翻身或活動。
 - ◆ 下床活動時，可使用安全別針將引流袋固定於衣服、繫在腰帶上或綁於腿部。

- 維持良好引流功能：建議術後採半坐臥式姿勢以利引流，多翻身，並儘早下床活動；當引流液量達袋子 1/2-2/3 量或充滿空氣時，請通知護理人員協助予以排空。

■ 預防感染：

- ◆ 引流處傷口保持乾燥清潔勿潮濕。
- ◆ 引流袋(瓶)應低於傷口或腰部以下，以避免引流液逆流回體內。
- ◆ 引流管若接有引流瓶時，應將瓶身維持站立、不可打翻。
- ◆ 避免壓迫及扭曲引流管，勿將引流袋擱置地面。

■ 若有以下情形，請告知護理人員：

- ◆ 引流管滑脫。
- ◆ 引流量突然減少。
- ◆ 傷口出現引流液滲出。
- ◆ 敷料滲濕。
- ◆ 流出多量鮮紅色液體。
- ◆ 傷口出現紅腫熱痛、膿樣分泌物時。

- 傷口周圍皮膚癢，切勿用手抓癢，改以輕拍方式，避免感染。

■活動：沒有太多的限制，只要避免引流管受拉扯即可。

■ 引流管拔除時機：

當引流液量逐漸減少，並經醫師評估後，會考慮移除引流管。

祝

早日康復

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5231-5233

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 2951-2953

新竹國泰綜合醫院 (03) 527899 轉 8101-8103

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

A5000.319.2014.01 一修