



認識結核用藥





國泰綜合醫院 內科部 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■ 結核用藥注意事項

- 早期接受治療，遵照醫師指示服藥。
- 勿中斷服用或擅自停藥，以免產生抗藥性。
- 大部分病人不會發生副作用，但會因個人體質而有不同症狀，若服藥時有任何不舒服，務必和您的主治醫師或結核病個管師連繫。

■ 結核用藥的種類

| 藥物名稱 | 藥物圖片 | 藥物副作用 |
|--------------------------|---|---|
| 立復黴素 Rifampin 150mg |  | 1. 橘色尿液及體液 2. 皮膚疹 3. 噁心、嘔吐、腹瀉 4. 肝功能異常 |
| 敵癆剋星片 Isoniazid 100mg |  | 1. 肝功能異常 2. 周邊神經病變 3. 過敏、紅疹及發燒 |

| 藥物名稱 | 藥物圖片 | 藥物副作用 |
|--------------------------------------|---|---|
| 敵癆新邁錠 Pyrazinamide 500mg |  | 1. 肝功能異常 2. 血中尿酸值變高 |
| 醫肺妥膜衣錠 Ethambutol 400mg |  | 1. 腎臟代謝，腎衰竭 病人劑量需調整 2. 視神經炎、紅綠色盲、視力減低 |
| 衛肺特糖衣錠 Rifater (INH+RIF+PZA) |  | 1. 橘色尿液及體液 2. 肝功能異常 3. 血中尿酸值變高 4. 腹瀉 5. 皮膚疹 |
| 樂肺寧糖衣錠 Rifinah 150mg (INH+RIF) |  | 1. 橘色尿液及體液 2. 肝功能異常 3. 皮膚疹 |

■ 疾病小叮嚀

- 初次發生傳染性結核病人，服藥二週後，大部分病人轉成不具傳染性。
- 持續服藥及定期追蹤複查痰液及胸部 x 光。
- 平時注意個人呼吸道防護，如戴口罩。
- 咳嗽有痰液時需用衛生紙包起來，經抽水馬桶沖掉。
- 均衡飲食、適時運動，提高免疫力。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 5261-5263

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院 關心您！

AA000.389.2014.04 二修