

居家化療－攜帶式輸液器

國泰綜合醫院 門診 護理部編印 著作權人：國泰綜合醫院
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

■何謂居家化療攜帶式輸液器？

經由攜帶式化療輸注器的方式，在不需住院及不影響日常生活下，進行居家化學治療的藥物注射。

■攜帶式輸注器(俗稱奶瓶)

■攜帶式輸注器，體積小攜帶方便且為全自動輸液器，利用正壓輸出原理，將藥物輸注至人體體內。藥物輸入時，沒運轉或警鳴聲，較不會干擾睡眠，及生活作息(如廁、工作、休閒活動)較不受影響。加藥後，重量約 300 至 350 公克，可置入口袋、皮包或腰包，隨身攜帶。使用時，不受電力控制或任何設定。

經醫師評估您的情況後，決定您是否適合使用攜帶式化學治療輸液器進行居家化學治療，此時在門診給藥，護理人員會教導如何自我照顧之事項及治療時間。


■充滿的儲藥囊會隨輸注時間增加而變輕變小，當儲液囊縮小至呈一長條時且兩旁的顆粒突起，表示藥物已滴完畢(圖一、二)，即可返回醫院移除。



圖一 裝滿藥物，儲藥囊呈充滿狀



圖二 藥物滴完，儲藥囊成一長條且兩旁的顆粒突起



突起的顆粒

■使用攜帶式化學治療的注意事項

◆日常生活方面

- 建議穿著寬鬆衣物，避免拉扯注射針頭，輸液器應放置腰包內，避免不慎碰撞，造成角針移位。
- 輸液器管路為特殊設計，不會因姿勢或壓迫而影響輸液。
- 攜帶式輸注器為壓克力製品，應避免直接接觸熱源，以防受熱破裂。

- 人工血管針頭注射部位，護理人員會以防水透明敷料固定，請盡量以沖澡或擦澡方式進行式，避免注射部位感染。
- 輸注器上有流速器可控制藥物於設定時間內滴完，但仍因溫度差異或藥物黏稠度，針頭粗細或人工血管順暢與否等因素，而提前或延後滴完。
- 若在設定滴完時間內，誤差 5 小時皆屬正常範圍，不會影響治療效果。若有上述情形，可於返院拔針時向醫護同仁反應，做為下次治療參考。

◆注射部位自我照護

- 注意人工血管處注射針頭有無滑脫。
- 管路連接處是否鬆落、管夾處是否為開放狀態及輸液儲藥囊是否持續穩定變小、變輕。
- 注射部位有無出現紅、腫、熱、痛、出血、滲漏或感覺異常(刺、脹、麻)等症狀。

若有上述情形，請立即關閉管夾並返回醫院處理。

■需立即返院處理的情況

若出現發燒、寒顫、呼吸急促、昏眩、皮膚紅疹或其他過敏反應、注射部位出血不止、潰爛或腫痛、大面積瘀青、嚴重腹瀉、血尿或血便(黑便)，以及不適症狀，應儘速返回醫院處理。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽

國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 3779 門診化療處置室

汐止國泰綜合醫院 (02)26482121 轉 8612 門診化療處置室

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！

A5000.403.2014.04 初訂