

# 施行靜脈鎮靜 之內視鏡特殊檢查

國泰綜合醫院 消化內科 編印 著作權人：國泰綜合醫院  
本著作非經著作權人同意，不得轉載、翻印或轉售

- 內視鏡特殊檢查時，為達降低病人的不舒適感及檢查過程中有良好的配合；同時達到病人安全照護目的，醫師會考慮給受檢病人施行靜脈鎮靜藥物注射，以利檢查順利進行；常見需施行靜脈鎮靜藥物之檢查項目包括：經內視鏡逆行性膽胰管攝影術、內視鏡膽胰超音波檢查、內視鏡黏膜下切除術等。
- 醫師首先於門診或病房開立相關檢查單張，同時評估是否需要於檢查中配合使用靜脈鎮靜藥物。特別要強調的是，不是所有的病人都適合在檢查時接受靜脈鎮靜藥物(特別病人是有呼吸中止症候群、致命性心律不整、心衰竭、年紀在 70 歲以上、或其他相關病史經評估不適宜接受靜脈鎮靜的狀況)，醫師於當天檢查前及檢查中，可能會依病人情況停止靜脈鎮靜藥物的使用，或因病人無法配合而中止檢查。

- 靜脈鎮靜不等於全身麻醉，即使在檢查中接受靜脈鎮靜，病人仍可能對檢查中的不舒服有印象。
- 接受靜脈鎮靜後，大部分病人會於 10~30 分鐘內清醒，但建議於完成檢查返家後，仍需有 4~6 小時安靜的睡眠。
- 因為檢查程序及靜脈鎮靜注射較為複雜，一定需要家屬陪同，家屬必須於需要時能全權代替病人做醫療決定，並能夠於檢查完成後，全程陪同病人返家休息。
- 經檢查醫師詳細說明檢查程序後，於檢查前完成同意書之簽署，並於檢查當日連同健保卡辦理報到手續。
- 檢查當天請穿著輕便好穿脫的上下兩件式衣褲。
- 檢查時間常有延誤，醫療團隊會盡力避免此種狀況，如仍遇到當天檢查有延遲，尚請見諒；另檢查完成時間不定，故請盡量多預留時間，以利檢查順利進行。

## ■ 檢查當天

- 檢查前至少需空腹 6 小時，請於預定檢查時間 30 分鐘前，先至本館三樓內視鏡櫃台完成報到並確認同意書已填寫完畢，再攜帶處置單至本館一樓門診處置室接受靜脈點滴軟管置入(置放於右手為建議首選)。

- 靜脈軟管置入及連接點滴管完成後，請至本館三樓內視鏡室櫃台報到。
- 檢查醫師會再次進行檢查前評估，確認實際上檢查當天病人可否接受靜脈鎮靜藥物。

## ■ 檢查中

- 於檢查床躺下後，我們會讓病人帶上經鼻氧氣管及接受心跳和血氧監控；家屬則會在檢查室外等候。
- 確認病人身體狀況許可下，醫師就會開始靜脈鎮靜藥物注射，藥物注射時靜脈會有略微不舒服的感覺，此為正常現象，不要擔心。
- 如果病人無法順利進行靜脈鎮靜(常見於有長期使用安眠藥、喝酒或較為緊張的病人)，醫師會根據當時狀況中止鎮靜，此時病人神智會在檢查中較為回復，請不要驚慌或嘗試說話，維持先前姿勢，配合醫師囑咐完成檢查。
- 檢查完成後請病人維持側躺姿勢，不要吞口水，在有進一步醫師指示前先臥床休息等候。

## ■ 檢查完成後

- 檢查完後到略為清醒可下床行走的程度約需 10~30 分鐘，根據病人的身體狀況不同，每人所需時間不盡相同，此時需要家屬在旁陪伴，並及時向工作人員反映狀況。
- 接受鎮靜藥物後，病人本人意識狀況尚無法開車、騎車、做精細動作或重大決策等，且腳步常會不穩，並協調性變差，需要家屬陪同協助返家，返家後仍建議 4~6 小時安靜的睡眠，隔天絕大部分病人都能恢復到平常狀況。
- 在意識完全恢復之後，即可先少量喝水，無吞嚥困難及噁心、嘔吐時，即可進食軟性溫和飲食，隔天可恢復正常飲食。
- 少數接受鎮靜藥物後的病人會出現吸入性肺炎、遲發性呼吸或心跳停止、惡性高熱等不良反應，相關症狀可危及生命且事前無法有效避免。如有相關情形發生，請盡速至本院急診求治。

此資料僅供參考，關於病情實際狀況，請與醫師討論

若有任何疑問，請洽 國泰綜合醫院 (02)27082121 轉 3120

我們將竭誠為您服務！

國泰綜合醫院關心您！