

## 肝穿刺 沒那麼危險

肝穿刺檢查，是國人最忌諱的檢查之一，這是訛傳的緣故，事實上，肝穿刺並不如想像中可怕。

早年需要做肝穿刺的是嚴重的肝癌病人，預後不好，一些人就怪罪於檢查。肝腫瘤、原發性肝癌或膽管癌等症狀的判定，或者是不易鑑別診斷之肝膿瘍或假性腫瘤，往往無法只靠顯像或血液檢查來確定診斷。因此經由肝穿刺檢查確認診斷相當重要。

另外，許多非腫瘤之疾病也需要肝穿刺做正確診斷。例如各種原因不明之急慢性肝炎及肝功能異常等病症需要接受肝穿刺，藉由病理組織的判讀，我們能夠獲得更多資訊解決病情。慢性 B 型肝炎或慢性 C 型肝炎病患如欲接受干擾素的治療，我們會建議病人在治療前先接受肝臟穿刺排除肝硬化的可能性。要知道，若是肝臟已達肝硬化的程度，則就不盡然能夠接受干擾素的治療。或許病患會有疑惑，醫生做的超音波不是沒看到肝硬化嗎？我們在此必須讓您了解，肝硬化的早期超音波可能不能很好地分辨出來。

我們會讓病人在住院中，先確定凝血功能是否完整，血小板數目是否足夠，然後在腹部超音波之引導下，選擇適當部位以穿刺針施行肝穿刺，穿刺前會施打局部麻醉劑 Xylocaine。接著我們進行穿刺，這個步驟只取小小的一條肝臟的組織，而並非切了一大塊肝臟組織下來。整個流程包括定位，只需幾分鐘。

檢查後我們會在傷口上以沙袋加壓，病人應側躺四到六小時，再臥床休息達二十四小時，以減少發生併發症之機會，同時我們會在剛穿刺後密集地測量病人之血壓及脈搏，早期預警併發症的發現，如腹膜炎。研究顯示，肝穿刺致命的危險約為萬分之一，因此在萬全的準備下施行肝穿刺，並沒有想像中那麼危險。