

30 萬人患有 C 型肝炎

台灣地區 C 型肝炎的盛行率，北部約為百分之一點五，與歐美先進國家大致雷同；南部地區則稍高，約為百分之四點五。目前，台灣約有三十萬人感染 C 型肝炎。

由於年紀愈長，得 C 型肝炎的機率愈高，顯示 C 型肝炎的傳播，主要還是後天經由血液及體液接觸而傳染。在過去，輸血曾經是主要的傳染途徑之一，其機率高達百分之八點二；自從針對捐血實施篩檢後，因輸血而得到 C 型肝炎的例子已極少了。

根據流行病學調查，南部某些地區 C 型肝炎感染盛行率異常地高，甚至高達當地人口約三分之一。台灣民眾習慣看病時要求注射治療，是否因使用有汙染之器材，或是另有其他感染途徑，值得進一步調查。

其他特定人口中，注射藥癮者也相當高，約在百分之五十至九十之間；人工腎臟透析及血友病則是較無辜的一群，可能因過去一再輸血或使用血液製品而感染。C 型肝炎不太容易（還是有機會）經由性行為感染，習慣出入色情場所者，得病的比率還是高於正常人口。

B 型肝炎帶原者也會再得到 C 型肝炎。研究顯示，同時感染 B 及 C 型肝炎的患者，其肝炎的程度比較厲害，發生肝硬化的比率也較高，對干擾素治療的反應也較差。